ЛП-№(000081)-(РГ-RU) от 31.07.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.07.2026 № 14929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Пантодерм, 5 %, крем для наружного применения

Действующее вещество: декспантенол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки, или медицинской сестры.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки, или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Пантодерм, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Пантодерм.

3. Применение препарата Пантодерм.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Пантодерм.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Пантодерм, и для чего его применяют

Препарат Пантодерм содержит действующее вещество декспантенол и относится к группе препаратов для лечения ран и язв, препаратам, способствующим нормальному рубцеванию.

Он стимулирует восстановление кожи после повреждений, нормализует обмен веществ в клетках.

Показания к применению

Препарат Пантодерм применяется у взрослых и детей в возрасте от 0 до 18 лет:

- при нарушении целостности кожных покровов: для заживления ожогов (в т. ч. солнечных), мелких повреждений кожи (ссадины, порезы, трещины и пр.);
- для профилактики и лечения сухости кожи, в том числе и как следствие дерматитов различного генеза (проявляющихся шелушением, покраснением, раздражением, чувством стянутости), а также ежедневного ухода за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов (лицо, руки);
- для ухода за молочной железой в период лактации (трещины и покраснения сосков молочной железы);
- для ухода за грудными детьми и младенцами (опрелость, «пеленочный» дерматит).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.07.2026 № 14929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Способ действия препарата Пантодерм

Декспантенол в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и играет важную роль как в формировании, так и в заживлении поврежденных кожных покровов; стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм.

При наружном применении быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму и выводится в неизмененном виде.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Пантодерм

Противопоказания

Не применяйте препарат Пантодерм:

- если у Вас аллергия на декспантенол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Пантодерм проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не наносите крем на мокнущие раны.

Другие препараты и препарат Пантодерм

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Какого-либо взаимодействия декспантенола с другими лекарственными средствами не зарегистрировано.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Пантодерм можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Если препарат используется для обработки трещин сосков во время грудного вскармливания, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Пантодерм не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Пантодерм содержит цетостеариловый спирт

Цетостеариловый спирт, входящий в состав препарата, может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Препарат Пантодерм содержит пропиленгликоль

Данный лекарственный препарат содержит 90 мг пропиленгликоля в каждом 1 г крема. Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи. Не применяйте данный лекарственный препарат на открытых ранах или больших площадях поврежденной или пораженной кожи

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.07.2026 № 14929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

(например, после ожогов) у детей младше 4 недель без консультации лечащего врача или работника аптеки.

3. Применение препарата Пантодерм

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Профилактика и лечение сухости кожи: крем наносят тонким слоем 1–2 раза в день и слегка втирают.

Пораженный участок кожи: крем наносят 1–2 раза в день.

Уход за молочными железами: крем наносят на поверхность сосков после каждого кормления.

Уход за грудными детьми: крем наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Длительность применения препарата и возможность повторного курса лечения зависят от индивидуальных особенностей течения заболевания и определяются достигнутым эффектом и переносимостью препарата.

Если Вы применили препарата Пантодерм больше, чем следовало

Декспантенол, даже в высоких дозах, хорошо переносится и не вызывает каких-либо нежелательных реакций. До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Пантодерм может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Сообщите врачу, если у Вас появятся:

- аллергические реакции, возникающие в крайне редких случаях.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://roszdravnadzor.gov.ru/

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.07.2026 № 14929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

5. Хранение препарата Пантодерм

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не применяйте препарат, если Вы заметили нарушение целостности тубы.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Пантодерм содержит

Действующим веществом является декспантенол.

Каждые 100 г крема содержат 5 г декспантенола.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: вазелин, пропиленгликоль, сквалан, парафин жидкий (масло вазелиновое), диметикон 100 cst, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт 60 %, стеариловый спирт 40 %], макрогола цетостеарат, пантолактон, вода очищенная.

Препарат Пантодерм содержит цетостеариловый спирт, пропиленгликоль (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Пантодерм и содержимое упаковки

Крем для наружного применения.

Крем от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, допускается наличие слабого характерного запаха.

По 30, 50 или 100 г в тубу алюминиевую. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29
Телефон: +7 (495) 702-95-03
Электронная почта: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.07.2026 № 14929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29
Телефон: +7 (495) 702-95-03
Электронная почта: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.