ЛП-№(000099)-(РГ-RU) от 24.08.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.08.2026 № 16336
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Клиндацин, 100 мг, суппозитории вагинальные

Действующее вещество: клиндамицин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Клиндацин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Клиндацин.
3. Применение препарата Клиндацин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Клиндацин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Клиндацин, и для чего его применяют

Препарат Клиндацин содержит действующее вещество клиндамицин, относящееся к группе «противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии; противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами; антибиотики».

Показания к применению

Препарат Клиндацин применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения бактериального вагиноза.

Способ действия препарата Клиндацин

Препарат Клиндацин нарушает процесс образования белка в клетке микробов, необходимого для их роста и деления, и, таким образом, останавливает размножение микробов (бактериостатическое действие).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клиндацин

Противопоказания

Не применяйте препарат Клиндацин:

- если у Вас аллергия на клиндамицин, на линкомицин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.08.2026 № 16336
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- если у Вас антибиотик-ассоциированный колит в анамнезе.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Клиндацин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

До назначения препарата с помощью соответствующих лабораторных методов Ваш лечащий врач должен исключить, что болезнь обусловлена бактериями, часто вызывающими вульвовагинит, такими как: *Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans* и *Herpes simplex virus*.

Интравагинальное применение клиндамицина может привести к усиленному росту нечувствительных микроорганизмов, особенно дрожжеподобных грибов.

При применении препарата Клиндацин (как и практически всех антибиотиков) внутрь и парентерально может развиться тяжелая диарея и в ряде случаев псевдомембранозный колит.

Немедленно сообщите Вашему лечащему врачу и прекратите применение препарата, если во время лечения у Вас возникнет:

- Выраженная и длительная диарея.

При необходимости, Ваш врач может решить провести соответствующие диагностические и лечебные мероприятия.

- Во время лечения препаратом не следует вступать в половые сношения, а также применять другие средства для интравагинального введения (тампоны, спринцевание).

Препарат содержит компоненты, которые могут уменьшить прочность изделий из латекса или каучука, например презервативов или противозачаточных вагинальных диафрагм.

- Не используйте изделия из латекса и каучука в течение 72 часов после терапии вагинальными суппозиториями Клиндацин.
- Не применяйте препарат Клиндацин в период менструации. Отложите начало терапии до окончания менструации.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Клиндацин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Существует перекрестная резистентность между клиндамицином и линкомицином.

Сообщите лечащему врачу, если Вы применяете препараты, расслабляющие мышцы. Клиндацин может усиливать действие других средств, блокирующих нейромышечную передачу, поэтому применяйте его с осторожностью, если Вы применяете такие препараты, как миорелаксанты периферического действия.

Не применяйте препарат Клиндацин с другими интравагинальными препаратами. Поскольку информация о применении с другими препаратами для интравагинального введения отсутствует, не применяйте препарат с другими интравагинальными средствами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.08.2026 № 16336
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Если Вы беременны, препарат Клиндацин можно применять во II или III триместре беременности только когда потенциальная польза терапии препаратом для матери превосходит потенциальный риск для плода.

Клиндацин можно применять в I триместре беременности только по абсолютным показаниям, т.е. когда потенциальная польза терапии препаратом для матери превосходит потенциальный риск для плода.

Если Вы беременны, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, который решит, подходит ли Вам этот препарат.

Грудное вскармливание

Неизвестно, выделяется ли клиндамицин в грудное молоко после интравагинального применения. Клиндамицин обнаружен в грудном молоке в концентрации <0,5–3,8 мкг/мл при применении препарата в дозах 150 мг перорально до 600 мг внутривенно. Клиндамицин обладает потенциальной способностью оказывать нежелательные эффекты на микрофлору желудочно-кишечного тракта у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, такие как диарея или кровь в кале, или сыпь. Если Вы кормите грудью и Вам требуется применение клиндамицина, это не является причиной для прекращения грудного вскармливания, но можно отдать предпочтение альтернативному лекарственному препарату. Следует учитывать пользу грудного вскармливания для развития и здоровья ребенка, а также клиническую необходимость применения клиндамицина у матери и любые потенциальные нежелательные эффекты, связанные с клиндамицином или основным заболеванием матери, для ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Фертильность

В исследованиях фертильности на крысах, получавших препарат перорально в дозах до 300 мг/кг/сутки (в 31 раз выше воздействия у человека при пересчете в мг/м^2), воздействия на фертильность или способность к размножению не выявлено.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Клиндацин не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Клиндацин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Используйте один суппозиторий один раз в сутки, предпочтительно перед сном.

Применение у детей и подростков

Безопасность и эффективность препарата Клиндацин у детей в возрасте от 0 до 18 лет на данный момент не установлены.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.08.2026 № 16336
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Путь и (или) способ введения

Только для интравагинального применения.

Введение суппозиториев без аппликатора:

Шаг 1. Извлеките суппозиторий из контурной ячейковой упаковки.

Шаг 2. В положении лежа на спине подтяните колени к груди. Удерживая суппозиторий двумя пальцами, введите его во влагалище как можно глубже, но избегая неприятных ощущений.

Шаг 3. Оказавшись во влагалище, суппозиторий расплавляется. Оставайтесь в горизонтальном положении, это позволит минимизировать вытекание препарата.

Шаг 4. Повторяйте действия с 1 по 3 перед сном еще 2 следующих дня.

Продолжительность терапии

Применяют в течение 3-х последовательных дней.

Если Вы применили препарата Клиндацин больше, чем следовало

При интравагинальном применении препарата Клиндацин возможно всасывание (абсорбция) клиндамицина в количествах, достаточных для развития системных реакций (см. разделы «Особые указания и меры предосторожности» и «Возможные нежелательные реакции»).

Симптомы

Случайное попадание препарата в желудочно-кишечный тракт также может вызвать системные эффекты, сходные с теми, которые возникают после приема внутрь клиндамицина в терапевтических дозах. К возможным системным побочным эффектам можно отнести диарею, кровавую (геморрагическую) диарею, включая псевдомембранозный колит (см. разделы «Особые указания и меры предосторожности» и «Возможные нежелательные реакции»).

Лечение

Симптоматическое и поддерживающее.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Клиндацин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Клиндацин и обратитесь к лечащему врачу, если у **Вас появились признаки и симптомы выраженной или длительной диареи, которые наблюдались часто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10).

При необходимости Ваш врач проведет соответствующие диагностические и лечебные мероприятия.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Клиндацин:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- грибковые инфекции, инфекции, вызываемые грибами рода *Candida*;
- головная боль;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.08.2026 № 16336
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- боль в животе, диарея, тошнота;
- зуд кожи;
- вульвовагинальный кандидоз, вульвовагинальная боль, вульвовагинальные расстройства.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- рвота;
- сыпь;
- боль в боку;
- инфекция почек (пиелонефрит), болезненное мочеиспускание (дизурия);
- вагинальные инфекции, выделения из влагалища, нарушение менструального цикла;
- боль в месте введения, зуд (в месте введения), локализованные отеки, боль, повышение температуры тела (гипертермия).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- острое воспаление толстого кишечника, вызывающее тяжелое поражение с болью, диареей и другими проявлениями (псевдомембранозный колит).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/.

5. Хранение препарата Клиндацин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.08.2026 № 16336
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Клиндацин содержит

Действующим веществом является клиндамицин.

Каждый суппозиторий содержит 100 мг клиндамицина (в виде фосфата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: полусинтетические глицериды (типа «Эстаринум», «Витепсол» или «Суппоцир»).

Внешний вид препарата Клиндацин и содержимое упаковки

Суппозитории вагинальные.

Белые или белые с желтоватым оттенком суппозитории цилиндроконической формы.

На продольном срезе отсутствуют вкрапления, допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

По 3 суппозитория помещают в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/ПЭ плёнки.

1 контурную ячейковую упаковку вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Республика Молдова

ООО «ФАРМАПРИМ»

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень, МД-4829

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.08.2026 № 16336
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).