ЛП-№(000216)-(РГ-RU) от 27.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Лизиноприл, 10 мг, таблетки

Лизиноприл, 20 мг, таблетки

Действующее вещество: лизиноприл

Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Лизиноприл, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Лизиноприл
3. Прием препарата Лизиноприл
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Лизиноприл
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Лизиноприл, и для чего его применяют

Лизиноприл принадлежит к группе препаратов, известных как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ингибиторы АПФ).

Показания к применению

Лизиноприл применяется у взрослых в возрасте от 18 лет при следующих состояниях:

- артериальная гипертензия (в монотерапии или в комбинации с другими гипотензивными средствами);

- хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии для лечения пациентов, принимающих сердечные гликозиды и/или диуретики);

- раннее лечение острого инфаркта миокарда (у пациентов со стабильными показателями гемодинамики в первые 24 часа для профилактики дисфункции левого желудочка и сердечной недостаточности);

- диабетическая нефропатия (для снижения альбуминурии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа с нормальным артериальным давлением (АД) и пациентов с сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией).

Способ действия препарата Лизиноприл

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Лизиноприл расширяет кровеносные сосуды, что приводит к снижению повышенного артериального давления. Он помогает сердцу перекачивать кровь по всему телу.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Лизиноприл

Противопоказания

Не принимайте препарат Лизиноприл, если:

- у Вас аллергия на лизиноприл или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- если у Вас когда-либо была аллергическая реакция на другой препарат из группы ингибиторов АПФ. Аллергическая реакция могла сопровождаться отеком кистей, стоп, лодыжек, лица, губ, языка или горла, затруднением глотания или дыхания (ангионевротический отек или отек Квинке);

- в случае развития у одного из Ваших родственников тяжелой аллергической реакции (отек Квинке) к ингибиторам АПФ или в случае развития у Вас тяжелой аллергической реакции (отек Квинке) по неизвестной причине;

- если Вы беременны или кормите грудью;

- если у Вас сахарный диабет и/или нарушение функции почек, и Вы принимаете препараты для снижения артериального давления, содержащие алискирен;

- если у Вас заболевание почек, связанное с сахарным диабетом, и Вы уже принимаете препараты из группы антагонистов рецепторов ангиотензина II;

- если Вы принимаете или принимали в течение последних 36 часов препараты, содержащие сакубитрил/валсартан для лечения сердечной недостаточности (при одновременном приеме препарата Лизиноприл с сакубитрилом/валсартаном повышается риск развития ангионевротического отека).

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, или если Вы не уверены, обратитесь за советом к лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с Вашим врачом перед началом приема препарата Лизиноприл.

Обязательно сообщите врачу, если какие-либо из нижеперечисленных пунктов относится к Вам:

- если Вы почувствовали головокружение, слабость, головную боль − признаки снижения артериального давления (артериальная гипотензия). Такое состояние может чаще возникать, если:

• у Вас имеются другие заболевания сердца,

• у Вас заболевания сосудов головного мозга,

• Вы принимаете мочегонные препараты (диуретики),

• у Вас в недавнем времени наблюдались диарея (понос), рвота или обезвоживание,

• Вы придерживаетесь диеты с ограничением поваренной соли.

Если Вы ощущаете признаки артериальной гипотензии, постарайтесь лечь на спину, слегка приподняв ноги.

Также сообщите врачу, если:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

- у Вас сужение аорты (артерии, отходящей от сердца) или сужение клапанов сердца (сужение митрального клапана, через которое кровь поступает из левого предсердия в левый желудочек);

- у Вас имеется увеличение толщины сердечной мышцы (гипертрофическая кардиомиопатия);

- у Вас заболевание почек или почечных артерий, так как Вам может потребоваться дополнительные анализы для оценки функции почек при подборе необходимой Вам дозы препарата и дальнейшего лечения;

- у Вас имеется нарушение функции печени;

- у Вас имеется системное заболевание соединительной ткани (такое как системная красная волчанка, склеродермия), или Вы получаете лечение препаратами, подавляющими иммунитет (иммунодепрессанты), препаратом аллопуринол (для лечения подагры), прокаинамид (для лечения нарушений сердечного ритма), так как совместный прием с лизиноприлом может повышать риск развития тяжелых инфекций. Врач может назначить Вам регулярный контроль анализов крови. Сообщите врачу о любых признаках инфекции;

- Вы принимаете препараты для лечения высокого артериального давления из группы блокаторов рецепторов ангиотензина II (также известные как сартаны, например, валсартан, телмисартан, ирбесартан и другие) или препараты, содержащие алискирен;

- у Вас наблюдается упорный сухой кашель на фоне приема препарата. Такого рода кашель может возникнуть на фоне приема и других препаратов группы ингибиторов АПФ;

- Вам предстоит проведение операции (включая стоматологические операции), так как возможно выраженное снижение артериального давления (артериальная гипотензия) при введении определенных местных или общих анестетиков на фоне применения препарата Лизиноприл;

- у Вас повышен уровень калия в крови (гиперкалиемия) или Вы принимаете препараты, которые могут повысить уровень калия в крови;

- у Вас сахарный диабет;

- Ваш возраст старше 65 лет;

- Вам была выполнена пересадка (трансплантация) почки;

- у Вас наблюдается значительное повышение уровня гормона альдостерона в крови (первичный гиперальдостеронизм).

Ваш лечащий врач может регулярно проверять у Вас артериальное давление, функцию почек, содержание электролитов в крови (например, калия). Также, пожалуйста, внимательно прочитайте информацию в разделе «Не принимайте препарат Лизиноприл».

Аллергия, ангионевротический отек

При приеме ингибиторов АПФ, в том числе лизиноприла может наблюдаться тяжелая аллергическая реакция с отеком лица, губ, языка или горла, затруднением глотания или дыхания (ангионевротический отек или отек Квинке), которая может возникнуть в любом периоде лечения. **В таких случаях прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью** (см. также раздел ««Возможные нежелательные реакции»).

В редких случаях на фоне лечения ингибиторами АПФ может развиться аллергическая реакция, сопровождающаяся болями в животе, тошнотой и рвотой (ангионевротический

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

отек кишечника). Для уточнения диагноза Ваш врач может назначить Вам дополнительные обследования органов брюшной полости.

Риск развития ангионевротического отека повышается:

- если ранее у Вас или Ваших родственников возникало подобное состояние (см. раздел «Не принимайте препарат Лизиноприл»);

- если Вы принадлежите к негроидной расе. Вы можете быть подвержены более высокому риску развития ангионевротического отека, а также этот препарат может быть менее эффективен для Вас в снижении артериального давления по сравнению с пациентами другой расовой принадлежности;

- если Вы принимаете следующие препараты (см. также раздел «Другие препараты и препарат Лизиноприл»):

• ингибиторы mTOR, используемые для предотвращения отторжения органов трансплантации (сиролимус, эверолимус, темсиролимус);

• сакубитрил/валсартан (см. раздел «Не принимайте препарат Лизиноприл»);

• глиптины, применяемые для лечения сахарного диабета;

• эстрамустин (применяемый для лечения рака);

• рацекадотрил (применяемый для лечения диареи);

• тканевые активаторы плазминогена (препараты для разрушения тромбов).

Тяжелые аллергические реакции также наблюдались у пациентов, получающих ингибиторы АПФ, которым проводили процедуру под названием «ЛПНП-аферез» с использованием декстран сульфата (лечение с целью снижения очень высокого уровня холестерина в крови), у пациентов, находящихся на гемодиализе, а также у пациентов, которые проходили десенсибилизирующее лечение (для снижения выраженности проявлений аллергии, например, при укусах ос или пчел).

Обязательно сообщите врачу, если Вам предстоят подобные процедуры, так как в подобных случаях лечение ингибиторами АПФ понадобится временно прекратить.

Дети и подростки

Не давайте препарат Лизиноприл детям в возрасте от 0 до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности, поскольку эффективность и безопасность не установлены.

Другие препараты и препарат Лизиноприл

Сообщите Вашему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать прием каких-либо других лекарственных средств, в том числе отпускаемых без рецепта, поскольку Лизиноприл может повлиять на действие других лекарственных препаратов и некоторые препараты могут повлиять на действие препарата Лизиноприл. Ваш врач может изменить дозу и/или принять другие меры предосторожности.

Особенно важно, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

- другие лекарственные средства для снижения артериального давления;

- антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА) или алискирен (см. также подразделы «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»);

- калийсберегающие диуретики (мочегонные препараты), препараты калия, калийсодержащие заменители пищевой соли и другие лекарственные препараты, способные увеличивать содержание калия в крови;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

- калийнесберегающие диуретики;

- препараты лития;

- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) для лечения боли и артрита, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) и высокие дозы ацетилсалициловой кислоты (более 3 граммов в сутки);

- препараты предназначенные для снижения уровня сахара в крови (гипогликемические лекарственные средства);

- препараты для лечения депрессии, психических заболеваний, для анестезии, наркотические средства;

- препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы (альфа и бета-адреномиметики);

- баклофен (препарат, используемый для снижения и снятия чрезмерного мышечного напряжения, возникающего при различных неврологических заболеваниях);

- препараты, содержащие этанол, а также если употребляете алкоголь;

- препараты, содержащие гормон эстроген;

- препараты, содержащие аллопуринол и прокаинамид, а также препараты относящиеся к группам цитостатиков, иммунодепрессантов, глюкокортикостероиды;

- препараты, содержащие золото;

- препараты для лечения депрессии, относящиеся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина;

- препараты, обычно используемые для предотвращения отторжения трансплантата (темсиролимус, сиролимус, эверолимус и другие препараты, относящиеся к классу ингибиторов mTOR);

- глиптины (препараты, применяемые для лечения диабета, такие как ситаглиптин, саксаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин);

- препараты для лечения опухолей, содержащие действующие вещество эстрамустин;

- препараты для лечения неврологических заболеваний, относящиеся к ингибиторам нейтральной эндопептидазы (НЭП);

- препараты для лечения и профилактики образования тромбов, содержащие тканевые активаторы плазминогена;

- антациды (препараты для снижения кислотности желудка);

- холестирамин (препарат, используемый для снижения холестерина в крови).

Одновременное применение следующих препаратов с препаратом Лизиноприл может увеличить риск развития ангионевротического отека (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»):

- сиролимус, эверолимус, темсиролимус (ингибиторы mTOR);

- глиптины − ситаглиптин, саксаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин;

- эстрамустин;

- рацекадотрил;

- сакубитрил/валсартан (см. раздел «Не принимайте препарат Лизиноприл»);

- тканевой активатор плазминогена.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Применение препарата Лизиноприл с едой и напитками

Лизиноприл таблетки можно принимать до, во время и после еды.

Во время приема препарата нельзя употреблять алкоголь.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Прием препарата Лизиноприл противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания. Эпидемиологические данные о риске тератогенности, связанном с приемом ингибиторов АПФ во время I триместра беременности, не являются убедительными, однако небольшое увеличение риска не может быть исключено.

Беременность

Сообщите лечащему врачу, если Вы думаете, что Вы беременны (или можете быть беременной). Ваш врач посоветует Вам прекратить прием препарата Лизиноприл прежде, чем Вы забеременеете или как только Вы узнаете, что беременны, и порекомендует принимать другое лекарственное средство. Препарат Лизиноприл не следует принимать во время беременности, так как он может нанести серьезный вред плоду, особенно если принимать его во втором и третьем триместрах беременности.

Грудное вскармливание

Сообщите лечащему врачу, если Вы кормите грудью или хотите кормить грудью. Препарат Лизиноприл не рекомендуется назначать кормящим матерям. Ваш врач может назначить другое лекарственное средство, если Вы хотите кормить грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При управлении транспортными средствами и работе с механизмами следует учитывать возможность развития головокружения или усталости при приеме данного препарата. Если эти нежелательные реакции наблюдаются у Вас, воздержитесь от управления транспортными средствами или работы с механизмами

3. Прием препарата Лизиноприл

Всегда принимайте препарат Лизиноприл в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Ваш врач может назначить Вам анализы крови после начала приема препарата Лизиноприл. Кроме того, он может назначить другую дозировку препарата, которая подойдет Вам лучше всего.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Ваша доза зависит от заболевания и от того, принимаете ли Вы какие-либо другие лекарственные средства.

Ваш врач скажет Вам, сколько таблеток следует принимать каждый день. Если Вы в чем-то не уверены, посоветуйтесь с Вашим врачом.

Для терапии высокого артериального давления

- Рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг один раз в сутки.

- Поддерживающая доза составляет 20 мг один раз в сутки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

- Максимальная доза составляет 40 мг один раз в сутки.

- При реноваскулярной гипертензии (повышенное артериальное давление, вызванное гормональной реакцией почек на сужение почечных артерий) и других состояниях с повышенной активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (гормональная система, регулирующая артериальное давление и баланс жидкости и электролитов) начальная доза составляет от 2,5 мг до 5 мг один раз в сутки.

Для терапии сердечной недостаточности

- Рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг один раз в сутки.

- Поддерживающая доза составляет от 2,5 мг до 10 мг один раз в сутки.

- Максимальная доза составляет 20 мг один раз в сутки.

После сердечного приступа

- Рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг в течение 24 часов после сердечного приступа и 5 мг через день.

- Обычная поддерживающая доза составляет 10 мг один раз в сутки.

Для терапии заболеваний почек, вызванных диабетом

- Рекомендуемая доза составляет 10 мг или 20 мг один раз в сутки.

Если Вы пожилой человек, имеете проблемы с почками или принимаете диуретические средства, Ваш врач может предписать Вам более низкие дозы, чем обычная доза.

Путь и (или) способ введения

Внутрь.

Принимайте таблетки ежедневно в одно и то же время, запивая стаканом воды.

Не имеет значения, принимаете ли Вы препарат до или после еды.

Прием первой дозы препарата

Будьте особенно осторожны при приеме первой дозы препарата Лизиноприл или при увеличении дозы, так как это может привести к значительному падению артериального давления.

Вы можете почувствовать дурноту или головокружение. Если это произойдет, Вам может помочь, если Вы сядете или ляжете.

Если Вас это беспокоит, пожалуйста, как можно скорее обратитесь к Вашему врачу.

Продолжительность терапии

Продолжайте прием препарата Лизиноприл до тех пор, пока Ваш врач не разрешит прекратить его прием, так как это длительное лечение. Важно принимать препарат каждый день.

Если Вы приняли препарата Лизиноприл больше, чем следовало

Если Вы приняли больше препарата Лизиноприл, чем предписано Вашим врачом, поговорите с врачом или немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Наиболее частыми симптомами передозировки являются головокружение и учащенное сердцебиение.

Другие симптомы включают сонливость, обморок, раздражительность, беспокойство, учащенное дыхание, учащенное или медленное сердцебиение, кашель, сухость во рту,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

нарушение функции почек, нарушение водно-электролитного баланса, задержку мочи, запор.

Если Вы забыли принять препарат Лизиноприл

Если Вы забыли принять дозу препарата, примите ее, как только вспомните. Однако, если уже почти наступило время для следующей дозы, пропустите забытую дозу.

Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную.

Если Вы прекратили прием препарата Лизиноприл

Не прекращайте прием препарата, не проконсультировавшись с врачом, даже если Вы чувствуете себя хорошо.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Лизиноприл может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Лизиноприл и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих **признаков аллергической реакции:**

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- тяжелые аллергические реакции, симптомы которых могут включать внезапное появление отека лица, губ, языка или горла, затруднения глотания, сильного или внезапного отека рук, ног и лодыжек, затрудненного дыхания, сильного кожного зуда с образованием волдырей (ангионевротический отек).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- внезапное падение артериального давления, учащенный и слабый пульс, обморочное состояние, кожная сыпь, зуд, затрудненное дыхание или хрипы (анафилактические и анафилактоидные реакции);

- тяжелые кожные реакции, включающие кожную сыпь, часто начинающуюся с появления красных зудящих участков на лице, руках или ногах (мультиформная эритема), или интенсивные кожные высыпания, крапивницу, покраснение кожи на всей поверхности тела, сильный зуд, возникновение пузырей, шелушение и отек кожи, воспаление слизистых оболочек (Синдром Стивенса − Джонсона, токсический эпидермальный некролиз).

Возможно развитие тяжелых нежелательных реакций. Немедленно сообщите врачу, если заметите следующие симптомы:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сильное головокружение или потеря сознания, вызванные резким снижением артериального давления.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- внезапная слабость или потеря чувствительности лица, конечностей, особенно с одной стороны тела, внезапная спутанность сознания, сильная или продолжительная головная боль (острое нарушение мозгового кровообращения вследствие выраженного снижения артериального давления);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

- боль, дискомфорт, давление, тяжесть, чувство сжатия или распирания в груди или за грудиной, холодный пот, тревога или одышка (сердечный приступ вследствие выраженного снижения артериального давления);

- уменьшение количества выделяемой мочи, появление отеков рук, ног (признаки острой почечной недостаточности).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- воспаление поджелудочной железы (панкреатит), признаками которого могут быть боли в животе, тошнота, рвота, нарушение пищеварения, общая болезненность или напряжение мышц живота;

- пожелтение кожных покровов и белков глаз (желтуха), потемнение мочи, которые могут быть симптомами нарушения функции печени, гепатита, печеночной недостаточности.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Лизиноприл:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;

- головокружение;

- кашель;

- диарея, рвота;

- нарушение функции почек.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- перепады настроения, нарушения сна, галлюцинации;

- чувство вращения предметов (вертиго), спонтанно возникающие ощущения жжения, покалывания (парестезия);

- изменения вкуса (дисгевзия);

- ощущение сердцебиения, учащенное сердцебиение (тахикардия);

- боль, онемение, похолодание и посинение в пальцах рук или ног (синдром Рейно);

- заложенность носа или насморк (ринит);

- тошнота, нарушение пищеварения, боль в животе;

- кожная сыпь, кожный зуд;

- импотенция (эректильная дисфункция);

- повышенная утомляемость, упадок сил (астения);

- изменения в анализах крови, включая повышение уровня калия, уровня «печеночных» ферментов, концентрации креатинина и мочевины.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (может проявляться такими симптомами, как головная боль, тошнота, рвота, потемнение мочи, нарушения сна, мышечная слабость или спазмы, судороги);

- спутанность сознания;

- нарушение обоняния, слабость, мышечные спазмы, сонливость;

- замедление сердцебиения, боль в груди, ухудшение сердечной недостаточности;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

- сухость во рту;

- псориаз (кожное заболевание);

- кожная сыпь;

- выпадение волос;

- увеличение молочных желез (гинекомастия);

- изменения результатов анализа крови, включая повышение уровня билирубина, СОЭ, снижение концентрации натрия, гемоглобина, гематокрита, положительные результаты теста на антинуклеарные антитела.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- изменения результатов анализа крови, включая снижение количества эритроцитов (анемия), значительное снижение общего количества лейкоцитов или определенных типов лейкоцитов (лейкопения, нейтропения), снижение количества тромбоцитов, увеличение числа эозинофилов;

- увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия);

- аутоиммунные нарушения;

- снижение концентрации глюкозы в крови;

- подавленное настроение;

- потеря сознания;

- ощущение боли и тяжести в области лица (синусит);

- чувство сжатия в груди, свистящее дыхание, связанное с бронхоспазмом;

- одышка;

- аллергическое воспаление легких (аллергический альвеолит, эозинофильная пневмония), может проявляться такими признаками, как нарушение дыхания, кашель, повышение температуры тела, ночная потливость;

- снижение аппетита или полная потеря аппетита;

- воспаление кишечника, связанное с реакцией гиперчувствительности (интестинальный ангионевротический отек);

- повышенная потливость;

- воспаление кровеносных сосудов (васкулит);

- покраснение или воспаление кожи из-за воздействия света (реакции фотосенсибилизации);

- появление пузырьков на коже;

- симптомы псевдолимфомы кожи, которые могут включать лихорадку, боль в мышцах и суставах, изменение показателей крови, воспаление кровеносных сосудов, кожная сыпь, повышенная чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей или другие кожные проявления;

- изменение количества выделяемой мочи.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- боль в суставах (артралгия);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

- мышечная боль (миалгия).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже) в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государств – членов ЕАЭС. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше информации о безопасности этого препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550 99 03

Эл. почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Веб-сайт: https://roszdravnadzor.gov.ru

Республика Армения

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. Академика

Э. Габриеляна» АОЗТ

Адрес: 0051, Ереван, проспект Комитаса, 49/5

Телефон: (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82 + 10 50

Горячая линия: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: naira@pharm.am; vigilance@pharm.am

Сайт: http://www.pharm.am

5. Хранение препарата Лизиноприл

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте Лизиноприл по истечении срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Лизиноприл содержит

Действующее вещество*:* лизиноприл.

Лизиноприл, 10 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 10 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, кальция дигидрофосфат, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, краситель железа оксид желтый (Е 172), магния стеарат, повидон К25.

Лизиноприл, 20 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 20 мг лизиноприла (в виде лизиноприла дигидрата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, кальция дигидрофосфат, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, краситель железа оксид желтый (Е 172), краситель железа оксид красный (Е 172), магния стеарат, повидон К25.

Внешний вид препарата Лизиноприл и содержимое упаковки

Таблетки.

Лизиноприл, 10 мг, таблетки

Круглые двояковыпуклые таблетки светло-желтого цвета с риской на одной стороне, со слегка заметными желтыми вкраплениями.

По 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По 2 или 3 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Лизиноприл, 20 мг, таблетки

Круглые двояковыпуклые таблетки светло-розового цвета с коричневатым оттенком с риской на одной стороне, со слегка заметными вкраплениями более темного цвета.

По 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По 2 или 3 блистера вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Северная Македония / Republic of North Macedonia

АЛКАЛОИД АД Скопье / ALKALOID AD Skopje

Бульвар Александар Македонски 12, 1000 Скопье / Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю или держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «АЛКАЛОИД-РУС»

115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, этаж 10, помещ./ком. I/1а

Тел.: (495) 502-92-97

E-mail: infoAlk@alkaloid.com.mk

Республика Армения

АЛКАЛОИД АД Скопье

Бульвар Александар Македонски 12

1000 Скопье, Республика Северная Македония

Тел.: + 389 2 310 40 00

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.02.2026 № 3301
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

E-mail: alkaloid@alkaloid.com.mk

Торговые наименования препарата в государствах-членах

Российская Федерация – Лизиноприл

Республика Армения – Скоприл, Skopryl®

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза http://eec.eaeunion.org