ЛП-№(000864)-(РГ-RU) от 03.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Листок-вкладыш – информация для пациента

АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ, 400 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: албендазол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ.
3. Прием препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ и для чего его применяют

Препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ содержит действующее вещество албендазол, относящееся к группе «антигельминтные средства; средства для лечения нематодозов; производные бензимидазола», то есть препаратов, применяемых для лечения глистных (гельминтных) заражений.

Показания к применению

Препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ применяется у взрослых и детей старше 3 лет.

Для лечения паразитарных болезней, вызванных круглыми червями (нематодозов):

- аскаридоза (возбудитель – аскарида);
- трихоцефалеза (возбудитель – власоглав);
- энтеробиоза (возбудитель – острица);
- анкилостомидоза (возбудители – кривоголовка и некатор);
- трихинеллеза (возбудитель – трихинелла);
- токсокароза (возбудитель – токсокара);
- лямблиоза (возбудитель – кишечная лямблия);
- стронгилоидоза (возбудитель – кишечная угрица);
- смешанных заражений (инвазий).

Для лечения паразитарных болезней, вызванных отложением личинок ленточных червей в различных тканях организма (тканевых цестодозов):

- нейроцистицеркоза (возбудитель – личинки ленточного паразита свиного цепня);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- гидатидозного эхинококкоза печени, легких, брюшины (возбудитель – личинки собачьего ленточного червя [эхинококк]);
- в качестве вспомогательного средства при хирургическом лечении альвеолярного эхинококкоза (возбудитель – эхинококк).

Способ действия препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ

Албендазол, попадая в организм паразита, находящегося в Вашем теле, нарушает его функционирование. Албендазол вызывает у паразита нарушение способности поглощать сахар, в результате чего он теряет энергию и погибает. В результате Вам становится легче.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ

Противопоказания

Не принимайте препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ, если:

- у Вас аллергия на албендазол, другие производные бензимидазола или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас есть заболевания сетчатки глаза;
- у Вас непереносимость некоторых сахаров – дефицит лактазы, непереносимость лактозы, нарушение усвоения глюкозы и галактозы (глюкозо-галактозная мальабсорбция);
- Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Не давайте препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ Вашему ребенку в возрасте до 3 лет, если лечение требуется ему (для данной лекарственной формы).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сообщите своему врачу, если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам, если:

- у Вас есть нарушения в работе печени;
- у Вас есть заболевание крови (нарушение костномозгового кроветворения);
- у Вас есть тяжелое заболевание печени (цирроз печени).

Если Ваше паразитарное заболевание привело к поражению глаз, то перед тем как начать лечение препаратом АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ, лечащий врач направит Вас на обследование глаз.

Во время лечения врач будет контролировать состояние Вашей крови, поскольку препарат может приводить к снижению числа белых клеток крови, что иногда может потребовать приостановку лечения.

Всем членам Вашей семьи рекомендовано пройти лечение от паразитов, чтобы исключить риск Вашего повторного заражения и защитить Ваших близких.

Для успешного лечения от паразитов перед назначением препарата необходимо пристально следить за чистотой дома и гигиеной (например, следует тщательно убирать помещение, вымыть детские игрушки, ежедневно утром и вечером проводить гигиенические процедуры, смену нижнего белья). Во время лечения и нескольких дней после приема препарата целесообразна более частая смена постельного белья или его проглаживание горячим утюгом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Дети

Не давайте препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ детям в возрасте от 0 до 3 лет (для данной лекарственной формы).

Другие препараты и препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите своему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать любые лекарственные препараты из перечисленных ниже:

- празиквантел (препарат, применяемый для лечения некоторых гельминтных заражений), дексаметазон (препарат, применяемый для лечения сильного воспаления или тяжелых аллергических заболеваний), циметидин (препарат, применяемый для лечения некоторых желудочно-кишечных заболеваний), поскольку это может привести к увеличению концентрации в крови активного метаболита албендазола (албендазола сульфоксида);
- препараты, применяемые для лечения судорог (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал), препараты и биологически активные добавки, содержащие женьшень обыкновенный, поскольку это может привести к снижению концентрации албендазола в кишечнике;
- теофиллин (препарат, применяемый для расширения бронхов при некоторых заболеваниях легких), поскольку это может привести к увеличению риска токсического действия теофиллина (симптомы включают тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение, судорожные припадки). В связи с этим лечащему врачу рекомендуется контролировать плазменные концентрации теофиллина во время лечения албендазолом.

Препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ с пищей и напитками

Во время лечения препаратом АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ избегайте употребления продуктов, содержащих грейпфрут, так как это может привести к увеличению риска развития неблагоприятных нежелательных реакций.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Женщинам детородного возраста перед началом лечения потребуется провести тест, чтобы подтвердить отсутствие беременности, поскольку препарат может нанести вред ребенку. Во время лечения препаратом АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ и в течение 1 месяца после его окончания необходимо использовать надежные методы контрацепции. Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом о способах контрацепции.

Не принимайте препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ во время беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ может вызывать головокружение и другие нежелательные реакции. Рекомендуется избегать управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты реакции.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ содержит лактозы моногидрат

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза:

Взрослые

Дозу препарата для Вас индивидуально установит лечащий врач в зависимости от вида паразитарного заражения и массы тела. Следуйте его рекомендациям.

Доза препарата не должна превышать 800 мг в сутки.

При нематодозах (в т. ч. аскаридозе, трихоцефалезе, некаторозе) албендазол назначают пациентам с массой тела 60 кг и более по 400 мг в сутки однократно; пациентам с массой тела менее 60 кг – по 15 мг/кг массы тела однократно или в 2 приема.

При энтеробиозе взрослые принимают препарат в дозе 400 мг однократно. Через 14 дней следует повторить курс лечения в той же дозе и в том же режиме.

При стронгилоидозе, анкилостомидозе взрослые принимают препарат в дозе 400 мг однократно в течение 3 дней. Через неделю рекомендуется провести повторный цикл лечения в тех же дозах.

При трихинеллезе препарат принимают в дозе 400 мг 2 раза в день в течение 10–14 дней.

При тяжелой инвазии и органных поражениях (воспаление сердечной мышцы [миокардит], воспалительное заболевание легких [пневмонит], воспаление вещества головного мозга и его оболочек [менингоэнцефалит]) лечащий врач дополнительно назначит также глюкокортикостероидные и симптоматические средства.

При токсокарозе взрослые с массой тела более 60 кг принимают препарат по 400 мг 2 раза в день в течение 10 дней, с массой тела менее 60 кг – 200 мг.

Требуется проведение повторных курсов лечения с интервалом в 2 недели/месяц. В процессе лечения лечащий врач будет контролировать показатели общего анализа крови (один раз в 5–7 дней) и активность печеночных ферментов (аминотрансфераз) в эти же сроки.

При нейроцистицеркозе (поражение головного мозга личинками свиного цепня) и гидатидозном (кистозном) эхинококкозе (тяжелое системное заболевание, вызываемое паразитами – эхинококками) пациентам с массой тела 60 кг и более принимать 400 мг 2 раза в сутки, с массой тела менее 60 кг – из расчета 15 мг/кг массы тела в день в два приема; максимальная суточная доза – 800 мг. Курс лечения при нейроцистицеркозе – 28–30 дней (за 2 дня до приема препарата и в первую неделю приема принимают глюкокортикостероидные препараты), при эхинококкозе – 3 цикла по 28 дней с 14-дневным перерывом между циклами.

При лямблиозе: 400 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней.

При смешанных инвазиях препарат принимают по 400 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней.

При необходимости курс лечения можно повторить через 1 месяц.

Перед применением препарата лечащий врач назначит Вам клинический анализ крови и биохимическое исследование крови. Лечение проводится при нормальных лабораторных показателях. В процессе лечения каждые 5–7 дней проводится исследование крови и оценка активности печеночных ферментов (аминотрансфераз). При значительном снижении числа

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

белых клеток крови (лейкоцитов) и повышении активности аминотрансфераз лечащий врач приостановит лечение до нормализации показателей. Лечение препаратом можно возобновить после того, как лабораторные показатели вернутся к уровню, который был до начала терапии, тем не менее во время лечения лабораторные исследования следует проводить регулярно.

Лечение албендазолом *альвеолярного эхинококкоза (поражение печени личинками эхинококка с образованием мелких кист, плотно прилегающих друг к другу)* является дополнительным средством. Дозы и режим назначения препарата такие же, как и при гидатидозном эхинококкозе. Продолжительность и курс лечения определит лечащий врач на основании Вашего состояния и переносимости препарата.

Применение у детей и подростков

При энтеробиозе дети старше 3 лет принимают препарат в дозе 400 мг однократно. Через 14 дней следует повторить курс лечения в той же дозе и в том же режиме.

При стронгилоидозе, анкилостомидозе дети старше 3 лет принимают препарат в дозе 400 мг однократно в течение 3 дней. Через неделю рекомендуется провести повторный цикл лечения в тех же дозах.

При токсокарозе дети старше 14 лет и с массой тела более 60 кг принимают препарат по 400 мг 2 раза в день в течение 10 дней, с массой тела менее 60 кг – 200 мг.

Требуется проведение повторных курсов лечения с интервалом в 2 недели/месяц. В процессе лечения лечащий врач будет контролировать показатели общего анализа крови (один раз в 5–7 дней) и активность печеночных ферментов (аминотрансфераз) в эти же сроки.

При лямблиозе: детям с массой тела менее 10 кг – 200 мг 1 раз в сутки однократно в течение 5 дней.

У детей следует по возможности избегать применения высоких доз албендазола в течение длительного времени.

Другая форма препарата может лучше подходить детям, поэтому проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Путь и (или) способ введения

Препарат принимают внутрь, во время или после приема пищи. Специальной подготовки и диеты не требуется.

Линия разлома (риска) не предназначена для разламывания таблетки.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения препаратом АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ определит Ваш лечащий врач, придерживайтесь его рекомендаций.

Если Вы приняли препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ больше, чем следовало

Если Вы или Ваш ребенок случайно приняли слишком много препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ, **обратитесь к лечащему врачу или за медицинской помощью**. Если есть возможность, возьмите с собой упаковку препарата, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

При передозировке может возникнуть усиление нежелательных реакций, перечисленных в разделе 4 листка-вкладыша.

Если Вы забыли принять препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ

Вы должны принимать препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Если Вы забыли принять препарат

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ

Придерживайтесь рекомендаций врача относительно лечения препаратом. Нельзя прекращать лечение самостоятельно, даже если Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите принимать препарат, лечение может оказаться неэффективным.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций**:

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (**ангионевротический отек**);
- предобморочное состояние или потеря сознания, снижение артериального давления, нарушение дыхания, бледно-синюшная, холодная, влажная кожа (**реакции гиперчувствительности [аллергические реакции] немедленного типа**);
- кожная сыпь или кожные поражения с розовым/красным кольцом и бледным центром, которые могут быть зудящими, чешуйчатыми или заполненными жидкостью. Сыпь чаще может появиться на ладонях или подошвах ног (**мультиформная эритема**);
- лихорадка и общее плохое самочувствие (недомогание), затем распространенная сыпь на коже и слизистых оболочках в виде пятен, пузырей, мокнущих эрозий, корок; отслойка участков кожи *(***синдром Стивенса – Джонсона**).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ:

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- угнетение выработки клеток крови в костном мозге с уменьшением их числа в крови (лейкопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения, апластическая анемия, подавление деятельности костного мозга, нейтропения);
- головная боль;
- головокружение;
- невозможность наклонить голову из-за повышенного напряжения мышц шеи, головная боль, боязнь света и звука, повышенная чувствительность кожи, рвота без предшествующей тошноты и не приносящая облегчения (менингеальные симптомы);
- повышение внутричерепного давления;
- повышение артериального давления;
- нарушение работы печени с изменением печеночных тестов (слабое или умеренное повышение активности печеночных трансаминаз);
- воспаление печени (гепатит);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- нарушение работы печени (острая печеночная недостаточность);
- боли в верхней части живота (эпигастрии);
- отсутствие аппетита (анорексия);
- запор;
- понос (диарея);
- сухость во рту;
- тошнота;
- рвота;
- зуд;
- кожная сыпь;
- нарушение работы почек (острая почечная недостаточность);
- высокая температура тела (гипертермия);
- повышенное выпадение волос (алопеция).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке после «До» или «ДО» и картонной пачке после «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ содержит

Действующим веществом является албендазол.

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 400 мг албендазола.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая тип 101, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмала гликолят), крахмал кукурузный, повидон К30, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный (аэросил), кроскармеллоза натрия, магния стеарат; *оболочка*: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000), титана диоксид.

Препарат АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ содержит лактозы моногидрат (см. раздел 2).

Внешний вид препарата АЛБЕНДАЗОЛ-АЛИУМ и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, двояковыпуклые, продолговатой формы со скругленными концами, с риской на одной стороне таблетки. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета. Допускается наличие специфического запаха.

По 1, 2, 4, 5 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

АО «АЛИУМ»

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2.

Телефон: +7 (495) 646-28-68

Электронная почта: info@binnopharmgroup.ru

Производитель

Российская Федерация

АО «АЛИУМ»

Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2, стр. 1.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «АЛИУМ»

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2.

Телефон: +7 (495) 646-28-68

Электронная почта: info@binnopharmgroup.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 27.02.2026 № 3787
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза: https://eec.eaeunion.org.