ЛП-№(005193)-(РГ-RU) от 26.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2026 № 2929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Метронидазол, 250 мг, таблетки

Действующее вещество: метронидазол.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Метронидазол, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Метронидазол.

3. Прием препарата Метронидазол.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Метронидазол.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Метронидазол, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Метронидазол является метронидазол – антибактериальное средство, применяющееся против некоторых видов микроорганизмов.

Препарата Метронидазол оказывает противопротозойное и противомикробное действие.

Показания к применению

Препарат Метронидазол показан к применению у взрослых и детей старше 6 лет для лечения:

- протозойных инфекций: внекишечного амебиаза (включая амебный абсцесс печени), кишечного амебиаза (амебной дизентерии), трихомониаза;
- инфекций, вызываемых *Bacteroides spp*. (в том числе *B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus*); инфекций костей и суставов; инфекций центральной нервной системы (ЦНС), в том числе менингита, абсцесса мозга; бактериального эндокардита; пневмонии, эмпиемы и абсцесса легких; сепсиса;
- инфекций, вызываемых *Clostridium spp., Peptococcus niger и Peptostreptococcus spp.:* инфекций брюшной полости (перитонита, абсцесса печени), инфекций органов малого таза (эндометрита, абсцесса фаллопиевых труб и яичников, инфекций свода влагалища);
- псевдомембранозного колита, связанного с применением антибиотиков;
- гастрита или язвы двенадцатиперстной кишки, связанных с *Helicobacter pylori* (в составе комплексной терапии);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2026 № 2929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- для профилактики послеоперационных осложнений (особенно после операций на ободочной кишке, в параректальной области, аппендэктомии, гинекологических операций).

Способ действия препарата Метронидазол

Метронидазол взаимодействует с ДНК микроорганизмов, ингибируя синтез нуклеиновых кислот, что ведет к их гибели.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Метронидазол

Противопоказания

Не принимайте препарат Метронидазол, если:

- у Вас аллергия на метронидазол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас диагностированы органические поражения ЦНС (в том числе эпилепсия);
- у Вас диагностирована сейчас или имелась в прошлом лейкопения (снижение уровня лейкоцитов в крови);
- у Вас диагностирована печеночная недостаточность (в случае назначения больших доз);
- Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Не давайте препарат Метронидазол детям младше 6 лет.

Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам или Вашему ребенку, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Метронидазол проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Во время лечения и в течение хотя бы одного дня после окончания приема препарата Вам не следует употреблять алкогольные напитки или лекарственные препараты, содержащие этанол – у Вас может появиться рвота, покраснение кожи, учащение сердцебиения.
- Во время лечения трихомонадного вагинита или уретрита Вам необходимо воздержаться от половых контактов. Вам обязательно нужно проходить лечение одновременно с Вашим половым партнером. Вам не следует прекращать лечение во время менструации.
- В случае появления психических нарушений, например суицидальных мыслей с депрессией или без нее, во время лечения препаратом Метронидазол, Вам необходимо прекратить лечение и незамедлительно обратиться к лечащему врачу.
- Прекратите лечение и незамедлительно обратитесь к лечащему врачу, если во время лечения препаратом Метронидазол возникнут такие симптомы, как лихорадка, недомогание, распространенная сыпь на коже и слизистых оболочках в виде пятен, пузырей, мокнущих эрозий, корок, отслойки участков кожи (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз или острый генерализованный экзантематозный пустулез).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2026 № 2929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Лабораторно-инструментальные исследования и анализы крови

Предупредите врача о приеме препарата Метронидазол, так как он может искажать результаты некоторых исследований крови – определение аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактатдегидрогеназы, триглицеридов, глюкозы, трепонемы.

Дети и подростки

Не давайте препарат Метронидазол детям от 0 до 6 лет, поскольку безопасность и эффективность не установлены.

Другие препараты и препарат Метронидазол

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы этих лекарственных препаратов или принять другие меры предосторожности. В некоторых случаях Вам придется прекратить прием некоторых лекарственных препаратов или препарата Метронидазол.

Особенно важно сообщить врачу о применении следующих лекарственных препаратов:

• дисульфирама (препарат для лечения алкоголизма);

• этанола;

• варфарина (препарат для предупреждения развития кровотечения);

• препаратов лития (применяются для лечения некоторых психических заболеваний);

• циклоспорина (препарат, снижающий активность иммунной системы);

• циметидина (препарат для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки);

• фенобарбитала, фенитоина (противосудорожные препараты);

• фторурацила, бусульфана (противоопухолевые препараты);

• векурония бромида (препарат для расслабления мышц при хирургических операциях);

• сульфаниламидов (противомикробные препараты).

Беременность, грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Во время беременности принимать метронидазол противопоказано, поскольку это может навредить Вашему нерожденному ребенку.

В период грудного вскармливания принимать метронидазол противопоказано, поскольку это может навредить Вашему ребенку.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Учитывая риск развития таких нежелательных реакций, как спутанность сознания, головокружение, галлюцинации, нарушения зрения, рекомендуется во время лечения воздерживаться от управления автомобилем, от занятий другими потенциально опасными

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2026 № 2929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Прием препарата Метронидазол

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

• При кишечном амебиазе метронидазол применяют в суточной дозе 1500 мг (по 2 таблетки 3 раза в сутки) в течение 7 дней.

• При острой амебной дизентерии суточная доза составляет 2250 мг (по 3 таблетки 3 раза в сутки).

• При абсцессе печени и других внекишечных формах амебиаза максимальная суточная доза составляет 2500 мг (разделенная на 3 приема) в течение 3–5 дней в комбинации с тетрациклиновыми антибиотиками и другими методами терапии.

• При трихомониазе у женщин (уретрите и вагините) метронидазол назначают однократно в дозе 2 г (8 таблеток) или в виде курсового лечения по 250 мг (по 1 таблетке) 2 раза в сутки в течение 10 дней.

• При трихомониазе у мужчин (уретрите) метронидазол назначают однократно в дозе 2 г (8 таблеток) или в виде курсового лечения по 250 мг (по 1 таблетке) 2 раза в сутки в течение 10 дней.

• Лечение анаэробных инфекций обычно начинают с внутривенных инфузий с последующим переходом на таблетки. Для взрослых доза препарата составляет 500 мг (2 таблетки) 3 раза в сутки. Длительность лечения составляет 7 дней.

• Для лечения псевдомембранозного колита метронидазол назначают по 500 мг (по 2 таблетки) 3–4 раза в сутки. Длительность лечения определяется врачом.

• Для эрадикации *Helicobacter pylori* метронидазол назначают по 500 мг (по 2 таблетки) 3 раза в сутки в составе комбинированной терапии (например, с амоксициллином).

• Для профилактики послеоперационных осложнений метронидазол назначают в суточной дозе 750–1500 мг (по 1–2 таблетки 3 раза в сутки) за 3–4 дня до операции. Через 1–2 дня после операции (когда уже разрешен прием внутрь) метронидазол назначают по 750 мг (3 таблетки) в сутки в течение 7 дней.

Применение у детей и подростков

При острой амебной дизентерии детям от 6 до 15 лет назначают суточную дозу 500 мг (разделенную на 2 приема).

При абсцессе печени и других внекишечных формах амебиаза детям от 6 до 15 лет назначают суточную дозу 500 мг (разделенную на 2 приема).

Путь и способ введения

Метронидазол принимают внутрь, до и после еды, запивая достаточным количеством воды.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2026 № 2929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Линия разлома (риска) предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

Если Вы приняли препарата Метронидазол больше, чем следовало

Симптомами передозировки могут быть: рвота, расстройство координации движений (атаксия) и дезориентация.

Если Вы приняли препарата больше, чем следовало, немедленно свяжитесь с врачом или обратитесь в отделение экстренной помощи ближайшей больницы.

Если Вы забыли принять препарат Метронидазол

Если Вы забыли принять препарат, примите следующую дозу в обычное время.

Не принимайте двойную дозу (две дозы в одно и то же время), чтобы компенсировать пропущенную.

Если Вы прекратили прием препарата Метронидазол

Не прекращайте прием препарата Метронидазол без консультации со своим врачом. Принимайте лекарственный препарат Метронидазол регулярно в течение периода времени, назначенного врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Метронидазол может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Кровь

• Агранулоцитоз (снижение уровня гранулоцитов и моноцитов в крови), лейкопения (снижение количества лейкоцитов в крови), нейтропения (снижение количества нейтрофилов в крови) и тромбоцитопения (снижение уровня тромбоцитов в крови).

Иммунная система

• Ангионевротический отек (тяжелая форма аллергической реакции), анафилактический шок (крайне тяжелая форма аллергической реакции).

Психика

• Психотические расстройства, включая спутанность сознания, галлюцинации;

• Депрессия, бессонница, раздражительность, повышенная возбудимость.

Нервная система

• Периферическая сенсорная нейропатия (нарушение чувствительности);

• Головная боль, судороги, головокружение;

• Сообщалось о развитии энцефалопатии (например, спутанности сознания) и подострого мозжечкового синдрома (нарушения координации и синергизма (содружественности) движений, атаксии (расстройство координации), дизартрии (нарушение речи), нарушений походки, нистагма (непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты) и тремора), которые подвергаются обратному развитию после отмены метронидазола;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2026 № 2929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

• Асептический менингит (воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга);

• Вертиго (головокружение).

Глаза

• Преходящие нарушения зрения, такие как диплопия (двоение), миопия (близорукость), нечеткость зрения, снижение остроты зрения, нарушение цветового восприятия;

• Нейропатия / неврит зрительного нерва.

Уши

• Нарушения слуха / потеря слуха (включая нейросенсорную глухоту);

• Шум в ушах.

Желудочно-кишечный тракт

• Боли в эпигастрии (верхней части живота), тошнота, рвота, диарея;

• Воспаление слизистой оболочки полости рта (глоссит (воспаление языка), стоматит (воспаление слизистых оболочек рта)), нарушения вкусовых ощущений («металлический» привкус во рту), снижение аппетита, анорексия (отсутствие аппетита), сухость слизистой оболочки полости рта, запор;

• Панкреатит (воспаление поджелудочной железы) (обратимые случаи);

• Изменение цвета языка / «обложенный» язык (из-за чрезмерного роста грибковой микрофлоры).

Печень

• Повышение активности «печеночных» ферментов (АСТ и АЛТ, щелочной фосфатазы), развитие холестатического или смешанного гепатита (воспаление печени), гепатоцеллюлярного поражения печени, иногда сопровождавшегося желтухой;

• У пациентов, получавших лечение метронидазолом в комбинации с другими антибиотиками, наблюдались случаи развития печеночной недостаточности, потребовавшей проведения трансплантации печени.

Кожа

• Сыпь, зуд, приливы крови к кожным покровам, гиперемия (покраснение) кожи, крапивница (появление на коже высыпаний, которые напоминают ожог крапивы);

• Пустулезная кожная сыпь (гнойнички);

• Острый генерализованный экзантематозный пустулез (острое высыпание в виде гнойничков);

• Фиксированная лекарственная сыпь;

• Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (острое угрожающее жизни заболевание аллергической природы).

Почки и мочевыводящие пути

• Возможно окрашивание мочи в коричнево-красноватый цвет, обусловленное наличием в моче водорастворимого метаболита метронидазола;

• Дизурия (нарушение мочеиспускания), полиурия (увеличенное образование мочи), цистит (воспаление мочевого пузыря), недержание мочи, кандидоз (поражение дрожжеподобным грибком).

Общие нарушения и реакции в месте введения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2026 № 2929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

• Лихорадка, заложенность носа, артралгии (боль в суставах), слабость.

Лабораторные и инструментальные данные

• Уплощение зубца Т на ЭКГ.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве

Здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефон: +996 (312) 21-92-78, (0800) 800-26-26

Факс: +996 (312) 21-05-08

Электронная почта: dlomt@pharm.kg, dlsmi@pharm.kg

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pharm.kg/

5. Хранение препарата Метронидазол

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке препарата после «Годен до:».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 ºС в оригинальной упаковке (в контурной ячейковой упаковке в пачке) для защиты от света.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию, водопровод. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2026 № 2929
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Препарат Метронидазол содержит
Действующим веществом является метронидазол.

Каждая таблетка содержит 250 мг метронидазола.
Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: крахмал картофельный, повидон (поливинилпирролидон, повидон К 17), стеариновая кислота.

Внешний вид препарата Метронидазол и содержимое его упаковки
Таблетки.

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого или белого с желтоватым или желтовато-зеленоватым оттенком цвета, с фаской и риской.

Линия разлома (риска) предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация
Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства")

Адрес: 305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Телефон: +7 (4712) 34-03-13

Электронная почта: leksredstva@pharmstd.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Кыргызская Республика

Российская Федерация
Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства")

Адрес: 305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Телефон: +7 (4712) 34-03-13

Электронная почта: leksredstva@pharmstd.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств:
http://eec.eaeunion.org/