ЛП-№(000206)-(РГ-RU) от 30.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.04.2026 № 8590
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Мукалтин, 50 мг, таблетки

Действующее вещество: алтея лекарственного травы экстракт

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 7–14 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Мукалтин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Мукалтин.
3. Прием препарата Мукалтин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Мукалтин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Мукалтин, и для чего его применяют

Препарат Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного и обладает отхаркивающими свойствами.

Относится к препаратам, применяемым при кашле и простудных заболеваниях в качестве отхаркивающего средства.

Показания к применению

Препарат Мукалтин применяется у взрослых и детей в возрасте от 12 до 18 лет по следующим показаниям:

- острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой повышенной вязкости (в том числе трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония) – в составе комплексной терапии.

Способ действия препарата Мукалтин

Мукалтин стимулирует движения ворсинок бронхов и выработку слизи, благодаря чему происходит разжижение мокроты и облегчение ее отхождения во время кашля.

Если улучшения не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 7–14 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Мукалтин

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.04.2026 № 8590
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Противопоказания

Не принимайте препарат Мукалтин:

- если у Вас аллергия на алтея лекарственного травы экстракт или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- если у Вас глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Мукалтин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Мукалтин не следует принимать одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми лекарственными средствами.

Дети

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 12 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Мукалтин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Мукалтин не следует принимать одновременно с препаратами, содержащими кодеин, и другими противокашлевыми лекарственными средствами, так как действие данных средств затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Мукалтин можно принимать одновременно с другими препаратами, применяемыми для лечения бронхолегочных заболеваний.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата Мукалтин во время беременности и кормления грудью возможно только по рекомендации врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Мукалтин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Мукалтин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит 23,8 мг натрия (основной компонент пищевой/столовой соли) в каждой таблетке. Это эквивалентно 1,19 % от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей.

3. Прием препарата Мукалтин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работником аптеки.

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.04.2026 № 8590
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза препарата у взрослых – 50–100 мг (1–2 таблетки) 2–3 раза в сутки.

Применение у детей и подростков

Режим дозирования у детей в возрасте от 12 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Путь и (или) способ введения

Внутрь, перед едой, запивая водой. Детям перед применением можно растворить 1–2 таблетки в 1/3 стакана теплой воды.

Линия разлома (риска) не предназначена для разламывания таблетки.

Продолжительность терапии

Курс лечения составляет в среднем 7–14 дней.

Если Вы приняли препарата Мукалтин больше, чем следовало

До настоящего времени случаи передозировки при применении препарата не зарегистрированы.

Если Вы забыли принять препарат Мукалтин

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Мукалтин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции, редко – диспепсические явления (тошнота).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или nrp@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Мукалтин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке или этикетке банки и картонной пачке после «ДО»/«Годен до:».

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.04.2026 № 8590
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 15 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Мукалтин содержит

Действующим веществом является алтея лекарственного травы экстракт.

Каждая таблетка содержит 50 мг алтея лекарственного травы экстракта (мукалтина экстракта сухого).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: натрия гидрокарбонат, винная кислота, кальция стеарат.

Препарат Мукалтин содержит натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Мукалтин и содержимое упаковки

Таблетки.

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета с вкраплениями, с фаской и риской, с характерным запахом.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 20, 30, 40, 50 или 60 таблеток в банки полимерные из полиэтилена низкого давления с навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого давления или в банки полимерные из полипропилена с натягиваемыми крышками из полиэтилена высокого давления с контролем первого вскрытия.

Каждую банку вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

По 1, 2, 3, 4, 5 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
АО «АВВА РУС»
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9
Тел.: + 7 (495) 956-75-54
info@avva-rus.ru

Производитель

Российская Федерация
АО «АВВА РУС»
Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 53А

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.04.2026 № 8590
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
АО «АВВА РУС»
121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9
Тел.: + 7 (495) 956-75-54
drug.safety@avva-rus.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).