ЛП-№(001338)-(РГ-RU) от 01.07.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12141
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Кандесартан, 8 мг, таблетки

Кандесартан, 16 мг, таблетки

Кандесартан, 32 мг, таблетки

Действующее вещество: кандесартан

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Кандесартан, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Кандесартан.

3. Прием препарата Кандесартан.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Кандесартан.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Кандесартан, и для чего его применяют

Препарат Кандесартан содержит действующее вещество кандесартан, относящееся к фармакотерапевтической группе препаратов под названием «средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему; антагонисты рецепторов ангиотензина II».

Препараты данной группы применяются для снижения артериального давления и лечения сердечной недостаточности.

Показания к применению

Препарат Кандесартан применяется у взрослых в возрасте от 18 лет:

– Артериальная гипертензия;

– Хроническая сердечная недостаточность и нарушение систолической функции левого желудочка (снижение фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) ≤ 40%) в качестве дополнительной терапии к ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или при непереносимости ингибиторов АПФ.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12141
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Способ действия препарата Кандесартан

Ангиотензин II – это вещество в организме, которое заставляет сосуды сужаться, что приводит к повышению артериального давления. Кандесартан блокирует действие ангиотензина II. В результате кровеносные сосуды расширяются и артериальное давление снижается. Кроме того, сердцу становится легче качать кровь ко всем частям тела.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Кандесартан

Противопоказания

Не принимайте препарат:

− если у Вас аллергия на кандесартан или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

− если у Вас тяжелое нарушение функции печени и/или холестаз (застой желчи);

− если Вы одновременно применяете препараты, содержащие алискирен, и у Вас сахарный диабет и/или умеренные или тяжелые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м^2 площади поверхности тела);

− если Вы одновременно принимаете ингибиторы АПФ и у Вас диабетическая нефропатия (нарушение функции почек как осложнение сахарного диабета);

− если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Кандесартан проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно сообщите врачу, если:
– у Вас нарушена функция почек (тяжелая почечная недостаточность);
– у Вас сужение сосудов почек (двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки);
– у Вас сужен просвет аорты в области клапана и сужен просвет между левым предсердием и левым желудочком сердца (гемодинамически значимый стеноз аортального и/или митрального клапана);
– Вам ранее была сделана пересадка почки;
– Вам проводятся процедуры гемодиализа;
– у Вас есть заболевания сосудов головного мозга (цереброваскулярные заболевания) и ишемическая болезнь сердца;
– у Вас повышено содержание калия в крови (гиперкалиемия) (если Вы принимаете средства, повышающие концентрацию калия в крови, например, препараты калия или заменители соли, содержащие калий, калийсберегающие препараты или гепарин, регулярно проверяйте уровень калия в крови);
– у Вас снижен объем циркулирующей крови (гиповолемия);
– у Вас состояние, связанное с повышенной продукцией гормона альдостерона (первичный гиперальдостеронизм);
– у Вас патологически увеличена сердечная мышца (гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия);
– Вы принимаете другой препарат для понижения давления (ингибитор АПФ) при

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12141
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

хронической сердечной недостаточности;
– у Вас пониженное давление крови (артериальная гипотензия);
– Вы принимаете другой препарат для понижения давления (алискирен или препарат, содержащий алискирен) если у Вас сахарный диабет и/или заболевания почек;
– у Вас будет проводиться общая анестезия и/или хирургическое вмешательство.

Сообщите врачу, если после приема препарата Кандесартан у Вас появились боли в животе, тошнота, рвота или диарея – это могут быть признаки ангионевротического отека кишечника. Врач примет решение о дальнейшем лечении. Не прекращайте прием препарата самостоятельно.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Кандесартан

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Это связано с тем, что препарат Кандесартан может повлиять на действие других препаратов или наоборот, может увеличить риск и степень серьезности нежелательных реакций.
Обязательно поставьте в известность лечащего врача, если Вы принимаете следующие препараты:
– другие препараты для понижения давления, в том числе такие как алискирен и ингибиторы АПФ (например, эналаприл, каптоприл, лизиноприл и др.), так как возможно еще большее понижение давления. Если у Вас сахарный диабет и/или умеренное или тяжелое нарушение функции почек, применение препарата с алискиреном Вам противопоказано.
Если у Вас диабетическая нефропатия, применение препарата с ингибиторами АПФ Вам противопоказано;
– калийсберегающие диуретики, препараты калия, заменители соли, содержащие калий, и другие средства, которые могут повышать содержание калия в сыворотке крови (например, гепарин);
– препараты лития (для лечения заболеваний нервной системы), так как возможно развитие токсических реакций из-за повышения концентрации лития в крови;
– нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), в том числе селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 и ацетилсалициловая кислота в дозе более 3 г в сутки, так как возможно снижение эффекта кандесартана. НПВП также могут увеличить риск нарушения функции почек, повысить содержание калия в сыворотке крови.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

<u>Беременность</u>
Не принимайте препарат Кандесартан во время беременности.
До планирования беременности обсудите с Вашим лечащим врачом альтернативные варианты терапии.
Если Вы забеременели во время терапии кандесартаном, немедленно прекратите принимать препарат, Ваш врач, при необходимости, назначит Вам альтернативное лечение.
Препараты, оказывающие прямое действие на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, при применении во время беременности могут вызывать нарушения развития плода или оказывать негативное действие на новорожденного, вплоть до летального исхода.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12141
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Грудное вскармливание
В настоящее время неизвестно, проникает ли кандесартан в грудное молоко. В связи с возможным нежелательным действием на грудных детей не принимайте препарат Кандесартан в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Кандесартан оказывает несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами, так как может вызвать головокружение и слабость. При появлении головокружения и слабости воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Препарат Кандесартан содержит лактозу и натрий

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.
Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть, по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Кандесартан

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Артериальная гипертензия

Рекомендуемая начальная доза препарата Кандесартан составляет 8 мг один раз в сутки. Лечащий врач может увеличить дозу до 16 мг один раз в сутки, а затем до 32 мг один раз в сутки, в зависимости от ответа на лечение.

Хроническая сердечная недостаточность

Рекомендуемая начальная доза препарата Кандесартан составляет 4 мг один раз в сутки. Лечащий врач может увеличить дозу до 16 мг один раз в сутки, а затем до 32 мг один раз в сутки с интервалом не менее 2 недель.
При необходимости применения кандесартана в дозе 4 мг следует принимать препараты других производителей в лекарственной форме «таблетки 4 мг».

Особые группы пациентов

Лица пожилого возраста
Коррекции начальной дозы не требуется.

Пациенты с нарушением функции почек
Если у Вас имеются заболевания почек, сообщите лечащему врачу. Ваш лечащий врач назначит начальную дозу – 4 мг один раз в сутки.

Пациенты с нарушением функции печени
Если у Вас имеются заболевания печени, сообщите лечащему врачу. Ваш лечащий врач назначит начальную дозу – 4 мг один раз в сутки. При необходимости врач может увеличить дозу препарата. Не принимайте препарат Кандесартан, если у Вас имеются тяжелые заболевания печени и/или застой желчи (холестаз).

Пациенты с другим сопутствующим заболеванием
Если у Вас снижен объем циркулирующей крови (гиповолемия), сообщите лечащему врачу. Ваш

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12141
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

лечащий врач назначит начальную дозу – 4 мг один раз в сутки.

Путь и (или) способ введения

Препарат Кандесартан принимайте внутрь независимо от приема пищи. Линия разлома (риска) не предназначена для разламывания таблетки.

Продолжительность терапии

Продолжительность терапии определяет лечащий врач.

Если Вы приняли препарата Кандесартан больше, чем следовало

При приеме препарата в дозировке, превышающей максимальную, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

При передозировке препарата Кандесартан могут наблюдаться следующие симптомы: выраженное снижение артериального давления, головокружение. При развитии указанных симптомов следует уложить пациента на спину, приподнять ноги.

Если Вы забыли принять препарат Кандесартан

В случае пропуска приема одной дозы препарата следующую дозу следует принять в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

Если Вы прекратили прием препарата Кандесартан

Не прекращайте прием препарата Кандесартан, не посоветовавшись с врачом. Ваше артериальное давление может снова повыситься.
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Прекратите прием препарата Кандесартан и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения любой из нижеперечисленных серьезных нежелательных реакций, которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- отек лица, губ, языка и/или горла, которые могут вызвать затруднение дыхания или глотания, интенсивный зуд кожи, появление сыпи и/или волдырей (признаки ангионевротического отека);
- боли в животе, тошнота, рвота или диарея (признаки ангионевротического отека кишечника);
- потеря аппетита, слабость, тошнота, рвота, боль в животе справа, темная моча, бледный стул, желтый цвет кожи и глаз, повышенная температура тела (признаки гепатита).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Кандесартан

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
- заболевания дыхательных путей (респираторные инфекции);
- головокружение/головокружение с потерей ориентации в пространстве (вертиго), головная боль;
- нарушения функции почек, включая почечную недостаточность у предрасположенных пациентов с факторами риска;
- боль в спине;
- слабость;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12141
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- повышенная концентрация калия в крови (гиперкалиемия);
- выраженное понижение давления.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):
- снижение в крови клеток крови – лейкоцитов (лейкопения);
- снижение в крови клеток крови – нейтрофилов (нейтропения);
- снижение в крови клеток крови – агранулоцитов (агранулоцитоз);
- снижение содержания натрия в крови (гипонатриемия);
- нарушение функции печени, отклонения показателей анализа крови, которые могут помочь врачу оценить функцию печени (повышение активности «печеночных» ферментов);
- кашель;
- тошнота;
- кожная сыпь, кожный зуд;
- кожные высыпания в виде волдырей, сопровождающиеся зудом, жжением (крапивница);
- боль в суставах (артралгия), боль в мышцах (миалгия).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012 г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Интернет-сайт: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Кандесартан

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
При упаковке в контурную ячейковую упаковку: хранить при температуре не выше 25°С в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке).
При упаковке в банку: хранить при температуре не выше 25°С в оригинальной упаковке (банка в пачке).
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Кандесартан содержит:

Действующим веществом является кандесартан.
Кандесартан, 8 мг, таблетки
Каждая таблетка содержит 8,0 мг кандесартана цилексетила.
Прочими вспомогательными веществами являются: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12141
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

моногидрат, крахмал прежелатинизированный, гипролоза низкозамещенная (гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная), кроскармеллоза натрия, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Кандесартан, 16 мг, таблетки
Каждая таблетка содержит 16,0 мг кандесартана цилексетила.
Прочими вспомогательными веществами являются: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, крахмал прежелатинизированный, гипролоза низкозамещенная (гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная), кроскармеллоза натрия, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Кандесартан, 32 мг, таблетки
Каждая таблетка содержит 32,0 мг кандесартана цилексетила.
Прочими вспомогательными веществами являются: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, крахмал прежелатинизированный, гипролоза низкозамещенная (гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная), кроскармеллоза натрия, натрия лаурилсульфат, магния стеарат.

Препарат Кандесартан содержит лактозу и натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Кандесартан и содержимое упаковки

Таблетки.
Препарат представляет собой таблетки круглые белого или почти белого цвета плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской на одной стороне.

Препарат Кандесартан доступен в следующих вариантах упаковки:
По 7 или 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
По 28 таблеток в банки полимерные из полиэтилентерефталата с крышками из полиэтилена для упаковки лекарственных средств.
По 2, 4 или 8 контурных ячейковых упаковок № 7, или по 3 или 6 контурных ячейковых упаковок № 10, или по 1 банке полимерной вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.
Не все размеры упаковок могут находиться в обороте.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ЗАО «Березовский фармацевтический завод»
623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, зд. 13А
тел./факс: +7(343) 215-89-01
e-mail: info@uralbfz.ru

Производитель

Российская Федерация
ЗАО «Березовский фармацевтический завод»
623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, зд. 13а
тел./факс: +7(343) 215-89-01
e-mail: info@uralbfz.ru

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.06.2026 № 12141
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:
Российская Федерация
ЗАО «Березовский фармацевтический завод»
623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Кольцевая, зд. 13А
тел./факс: +7(343) 215-89-01
e-mail: info@uralbfz.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза https://grls.minzdrav.gov.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).