ЛП-№(009042)-(РГ-RU) от 22.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Листок-вкладыш – информация для пациента

КАРВЕДИЛОЛ, 6,25 мг, таблетки

КАРВЕДИЛОЛ, 12,5 мг, таблетки

КАРВЕДИЛОЛ, 25 мг, таблетки

Действующее вещество: карведилол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат КАРВЕДИЛОЛ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата КАРВЕДИЛОЛ.
3. Прием препарата КАРВЕДИЛОЛ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата КАРВЕДИЛОЛ.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат КАРВЕДИЛОЛ, и для чего его применяют

Лекарственный препарат КАРВЕДИЛОЛ содержит в качестве действующего вещества карведилол и принадлежит к группе препаратов «бета-адреноблокаторы; альфа- и бета-адреноблокаторы».

Показания к применению

Лекарственный препарат КАРВЕДИЛОЛ применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения:

- эссенциальной гипертензии (в монотерапии или в комбинации с другими гипотензивными средствами, например, блокаторами «медленных» кальциевых каналов или диуретиками);
- ишемической болезни сердца (в том числе у пациентов с нестабильной стенокардией и безболевой ишемией миокарда);
- хронической сердечной недостаточности - лечение стабильной и симптоматической легкой, умеренной и тяжелой хронической сердечной недостаточности (II-IV функционального класса по классификации NYHA) ишемического или неишемического генеза в комбинации с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и диуретиками, с или без сердечных гликозидов (стандартная терапия), при отсутствии противопоказаний.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Способ действия препарата КАРВЕДИЛОЛ

Карведилол блокирует специфические белковые структуры альфа- и бета-адренорецепторы. За счет одновременной блокады указанных рецепторов происходит расширение кровеносных сосудов (вазодилатирующее действие) и снижение артериального давления, уменьшается пред- и постнагрузка на сердце и потребность сердечной мышцы в кислороде, который необходим для работы сердца (антиангинальное действие). Карведилол нормализует сердечный ритм (антиаритмическое действие) и незначительно снижает частоту сердечных сокращений.

У пациентов с артериальной гипертензией и заболеваниями почек карведилол уменьшает резистентность почечных сосудов, при этом не происходит существенного изменения скорости клубочковой фильтрации, почечного плазмотока или экскреции электролитов. Периферический кровоток сохраняется, поэтому похолодание рук и ног, часто отмечаемое при приеме бета-адреноблокаторов, развивается редко.

При нарушении функции левого желудочка сердца и/или сердечной недостаточностью карведилол благоприятно влияет на гемодинамические показатели и улучшает фракцию выброса и размеры левого желудочка.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата КАРВЕДИЛОЛ

Противопоказания

Не принимайте препарат КАРВЕДИЛОЛ, если:

- у Вас гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- у Вас острая и хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, требующая внутривенного введения инотропных средств;
- у Вас клинически значимое нарушение функции печени;
- у Вас атриовентрикулярная блокада II и III степени (за исключением пациентов с электрокардиостимулятором);
- у Вас частота сердечных сокращений (ЧСС) менее 50 уд/мин (выраженная брадикардия);
- у Вас синдром, характеризующийся нарушением нормального образования электрического импульса в сердце (синдром слабости синусового узла), включая особое нарушение проведения импульса к предсердиям (синоаурикулярную блокаду);
- у Вас систолическое артериальное давление (АД) менее 85 мм рт. ст. (тяжелая артериальная гипотензия);
- Вы находитесь в опасном для жизни состоянии, при котором сердце внезапно перестает перекачивать достаточное количество крови (кардиогенный шок);
- имеются данные, указывающие на то, что у Вас есть заболевание, характеризующееся затруднением дыхания, чувством нехватки воздуха, удушьем, свистящим дыханием, спровоцированным сужением просвета бронхов (бронхоспазм), или хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей (бронхиальная астма);
- у Вас опухоль надпочечников, которая выделяет гормоны – катехоламины, повышающие артериальное давление (феохромоцитома) и Вы не принимаете альфа-адреноблокаторы.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата КАРВЕДИЛОЛ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно сообщите врачу о том, что у Вас имеются следующие заболевания или состояния:

- хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и сужением просвета бронхов (хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ));
- депрессия;
- заболевание, проявляющееся слабостью и быстрой утомляемостью мышц (миастения);
- низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия);
- имеется нарушение проведения электрического импульса по сердечной мышце (атриовентрикулярная блокада I степени);
- заболевание, связанное с повышенным содержанием гормонов щитовидной железы в крови (тиреотоксикоз);
- обширные хирургические вмешательства и проведение общей анестезии. Вам необходимо предупредить врача-анестезиолога о предшествующем лечении препаратом КАРВЕДИЛОЛ в связи с возможным усилением отрицательных эффектов карведилола и препаратов для общей анестезии;
- синдром, развивающийся в результате нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, характеризующийся появлением боли в груди в покое или во время сна (стенокардия Принцметала). Препарат КАРВЕДИЛОЛ может провоцировать появление болей в груди;
- высокий уровень глюкозы в крови (сахарный диабет);
- заболевания, характеризующиеся сужением и закупоркой сосудов (окклюзионные заболевания периферических сосудов);
- подозрение на опухоль надпочечников, которая выделяет гормоны – катехоламины, повышающие артериальное давление (феохромоцитома). До начала приема препарата КАРВЕДИЛОЛ врач может назначить Вам препараты из группы альфа-адреноблокаторов;
- нарушение функции почек (почечная недостаточность);
- хроническое иммуновоспалительное заболевание кожи с появлением зудящих воспалительных высыпаний с чешуйками (псориаз);
- тяжелое заболевание сердца с нарушением насосной функции (хроническая сердечная недостаточность);
- заболевания периферических сосудов, в том числе синдром, характеризующийся спазмом сосудов, изменением цвета кожи, онемением и болью в пальцах рук или ног (синдром Рейно). Препарат КАРВЕДИЛОЛ может усиливать симптомы состояния, вызванного ухудшением кровотока (артериальная недостаточность).

Если у Вас тяжелое заболевание сердца с нарушением насосной функции (хроническая сердечная недостаточность), до назначения препарата КАРВЕДИЛОЛ Ваш врач в первую очередь подберет Вам необходимую дозу мочегонного препарата. Если в период лечения препаратом КАРВЕДИЛОЛ у Вас появилась или усилилась одышка, увеличился вес или наросли отеки конечностей, Вам необходимо обратиться к Вашему врачу, Ваш лечащий врач

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

может рекомендовать Вам увеличить дозу мочегонных препаратов, возможно уменьшить дозу препарата КАРВЕДИЛОЛ или временно его отменить.

Во время приема препарата КАРВЕДИЛОЛ возможно временное ухудшение функции почек. Если у Вас хроническая сердечная недостаточность и низкое артериальное давление (систолическое артериальное давление менее 100 мм рт. ст.), или у Вас заболевание, которое характеризуется недостаточным обеспечением сердца кислородом (ишемическая болезнь сердца) и есть нарушения структуры (диффузные изменения) сосудов и/или нарушение функции почек (почечная недостаточность), Ваш лечащий врач может рекомендовать Вам выполнить анализ для оценки функции почек и подберет дозу препарата, наиболее подходящую Вам в зависимости от состояния функции почек.

При приеме препарата КАРВЕДИЛОЛ в результате повышения сопротивления дыхательных путей может развиться ощущение нехватки воздуха (одышка). Врач будет наблюдать за Вашим состоянием в начале лечения и во время увеличения дозы. При появлении затруднения дыхания, чувства нехватки воздуха, удушья, свистящего дыхания, спровоцированных сужением просвета бронхов (бронхоспазма), обратитесь к Вашему врачу, он может уменьшить дозу препарата.

Если у Вас сахарный диабет, во время приема препарата КАРВЕДИЛОЛ Ваш врач может рекомендовать Вам чаще контролировать уровень сахара в крови, при значимом снижении или повышении уровня сахара, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об этом Вашему врачу.

Препарат КАРВЕДИЛОЛ снижает частоту сердечных сокращений. При снижении частоты сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту, сообщите об этом Вашему врачу, он может рекомендовать Вам снизить дозу препарата.

При появлении кожной сыпи, поражении слизистых оболочек или любых других признаков аллергии прекратите прием препарата КАРВЕДИЛОЛ и обратитесь за медицинской помощью. Если во время лечения препаратом КАРВЕДИЛОЛ у Вас появились красноватые пятна, похожие на мишени или круги, иногда с волдырями в середине, в виде язв во рту, горле, носу, на гениталиях и глазах, лихорадка и/или симптомы простуды (признаки опасных кожных реакций, таких как токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона), немедленно прекратите прием препарата и обратитесь за медицинской помощью.

Если Вы пользуетесь контактными линзами, помните о возможном уменьшении количества слезной жидкости. При возникновении сухости глаз сообщите об этом Вашему врачу.

Лечение препаратом КАРВЕДИЛОЛ проводится длительно. Не прекращайте терапию препаратом КАРВЕДИЛОЛ резко, не посоветовавшись с Вашим врачом. Необходимо постепенно уменьшать дозу препарата с недельными интервалами.

Это важно для того, чтобы врач в полной мере смог оценить, насколько Вам безопасно применять данный препарат и потребуется ли соблюдение особых мер предосторожности.

Дети

Не давайте препарат КАРВЕДИЛОЛ детям от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения в данной возрастной группе не установлены

Другие препараты и препарат КАРВЕДИЛОЛ

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты:

- дигоксин (препарат, применяемый для лечения заболеваний сердца);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- циклоспорин (препарат, применяемый для предупреждения отторжения пересаженных органов);
- рифампицин (препарат, применяемый для лечения бактериальных инфекций);
- амиодарон (препарат, применяемый для лечения нарушений сердечного ритма);
- флуоксетин, пароксетин (препараты, применяемые для лечения депрессии и других психических нарушений);
- препараты для снижения уровня сахара в крови (инсулин и другие гипогликемические средства);
- препараты, снижающие содержание гормонов надпочечников – катехоламинов (например, резерпин и ингибиторы моноаминоксидазы);
- препараты для снижения артериального давления и лечения аритмии и других заболеваний сердца (недигидропиридиновые блокаторы «медленных» кальциевых каналов, такие как верапамил, дилтиазем);
- препараты, применяемые для лечения нарушений сердечного ритма (например, амиодарон);
- клонидин (препарат, применяемый для снижения артериального давления);
- препараты, применяемые для снижения артериального давления (гипотензивные средства, например, альфа$_1$-адреноблокаторы (празозин, доксазозин и др.)) или препараты, которые вызывают снижение артериального давления в качестве нежелательной реакции);
- препараты, применяемые для проведения наркоза (средства для общей анестезии);
- препараты, применяемые для снятия боли, жара и воспаления (нестероидные противовоспалительные препараты);
- препараты, применяемые для лечения заболеваний дыхательных путей (бронходилататоры (агонисты бета-адренорецепторов)).

При совместном приеме препарата КАРВЕДИЛОЛ и других препаратов для лечения заболеваний сердца (из группы недигидропиридиновых блокаторов «медленных» кальциевых каналов (верапамила или дилтиазема) или антиаритмических препаратов) Ваш врач может рекомендовать Вам чаще контролировать артериальное давление и пройти электрокардиографию (ЭКГ).

Если Вы не уверены насчет того, какие препараты Вы принимаете, и можно ли принимать их одновременно с препаратом КАРВЕДИЛОЛ, посоветуйтесь с Вашим врачом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Лекарственный препарат КАРВЕДИЛОЛ уменьшает плацентарный кровоток, что может привести к внутриутробной гибели плода и преждевременным родам. Кроме того, у плода и новорожденного могут возникать нежелательные реакции (в частности, гипогликемия и брадикардия, осложнения со стороны сердца и легких). Исследования на животных не выявили у карведилола тератогенного эффекта. Достаточного опыта применения препарата у беременных нет. Карведилол противопоказан при беременности, за исключением случаев,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

когда возможные преимущества его применения у женщин превышают потенциальный риск для плода.

Грудное вскармливание

В настоящий момент не установлено, проникает ли лекарственный препарат КАРВЕДИЛОЛ в грудное молоко у человека. Однако большинство бета-адреноблокаторов липофильной структуры в различной степени проникают в грудное молоко. Таким образом, при необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание необходимо прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Учитывая потенциально возможные побочные действия препарата КАРВЕДИЛОЛ, его следует принимать с осторожностью пациентам, работа которых требует быстрой психомоторной реакции, особенно в начале лечения, а также при одновременном приеме алкоголя (риск развития головокружения, астении).

Препарат КАРВЕДИЛОЛ содержит лактозу

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата КАРВЕДИЛОЛ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Эссенциальная гипертензия

Рекомендованная начальная доза составляет 12,5 мг 1 раз в сутки в первые 2 дня проведения терапии, затем по 25 мг 1 раз в сутки. При необходимости в дальнейшем Ваш врач может увеличить дозу с интервалами не менее 2 недель, доводя до максимальной рекомендованной дозы 50 мг 1 раз в сутки (или разделенной на 2 приема по 25 мг).

Ишемическая болезнь сердца

Рекомендованная начальная доза составляет 12,5 мг 2 раза в сутки в первые 2 дня, затем по 25 мг 2 раза в сутки. При необходимости Ваш врач может увеличить дозу с интервалами не менее 2 недель, доводя до максимальной суточной дозы, равной 100 мг, разделенной на 2 приема по 50 мг.

Хроническая сердечная недостаточность

Ваш врач подберет дозу наиболее подходящую для Вас. Если Вы принимаете сердечные гликозиды, диуретики и ингибиторы АПФ, то врач скорректирует их дозы до начала лечения препаратом КАРВЕДИЛОЛ.

Рекомендованная начальная доза составляет 3,125 мг 2 раза в сутки в течение 2 недель. При хорошей переносимости Ваш врач увеличит дозу до 6,25 мг 2 раза в сутки с интервалами не менее 2 недель, затем до 12,5 мг 2 раза в сутки, потом до 25 мг 2 раза в сутки.

Если у Вас тяжелая хроническая сердечная недостаточность, легкая и умеренная степень хронической сердечной недостаточности и Ваша масса тела менее 85 кг – рекомендованная максимальная доза составит 25 мг 2 раза в сутки.

Если у Вас легкая и умеренная степень хронической сердечной недостаточности и масса тела более 85 кг – рекомендованная максимальная доза составит 50 мг 2 раза сутки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Если Вы прервали лечение препаратом КАРВЕДИЛОЛ больше чем на 1 неделю, то его назначение возобновляют в меньшей дозе, а затем Ваш врач подберет наиболее подходящую дозу для Вас.

Если Вы прервали лечение препаратом КАРВЕДИЛОЛ более чем на 2 недели, то его назначение следует возобновлять в дозе 3,125 мг 2 раза в сутки, затем Ваш врач подберет наиболее подходящую дозу для Вас.

Путь и (или) способ введения

Таблетки следует принимать внутрь, запивая достаточным количеством воды.

Пациентам с хронической сердечной недостаточностью препарат КАРВЕДИЛОЛ следует принимать во время еды, чтобы замедлить скорость всасывания и уменьшить риск ортостатической гипотензии.

Линия разлома (риска) предназначена исключительно для упрощения разделения таблетки и ее проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

Если Вы приняли препарата КАРВЕДИЛОЛ больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата КАРВЕДИЛОЛ больше, чем следовало, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не забудьте взять с собой упаковку данного препарата или этот листок-вкладыш.

Симптомами передозировки могут быть: выраженное снижение АД (сопровождающееся головокружением или обмороком), выраженная брадикардия (ЧСС менее 50 уд/мин), вследствие бронхоспазма возможно возникновение одышки, рвоты. В тяжелых случаях возможны нарушение дыхания, спутанность сознания, генерализированные судороги, сердечная недостаточность, нарушения проводимости, кардиогенный шок, остановка сердца.

Если Вы забыли принять препарат КАРВЕДИЛОЛ

Если Вы забыли принять дозу препарата, не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Примите следующую запланированную дозу в обычное время.

Если Вы прекратили прием препарата КАРВЕДИЛОЛ

Не прекращайте прием препарата КАРВЕДИЛОЛ, не посоветовавшись со своим лечащим врачом, так как это может привести к потере эффективности лечения. Врач будет рекомендовать Вам постепенно уменьшать дозу препарата с недельными интервалами. Резкая отмена препарата может привести к ухудшению Вашего состояния.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат КАРВЕДИЛОЛ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата КАРВЕДИЛОЛ и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций:

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- сердечная недостаточность (затруднение дыхания (одышка), отеки нижних конечностей, повышенная утомляемость).

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- воспаление легких (пневмония), симптомами которого может быть повышение температуры тела, кашель, затруднение дыхания, боль при дыхании, слабость;
- опасное для жизни состояние, для которого характерно накопление жидкости в легких - отек легких (появление одышки в покое, затруднение дыхания в положении лежа, учащенное неглубокое дыхание, сухой кашель, синюшность кожных покровов);
- спазм бронхов – бронхоспазм (затруднение дыхания, чувство нехватки воздуха, удушье, свистящее дыхание);
- тяжелое поражение почек – почечная недостаточность и нарушение функции почек (утомляемость, слабость, отеки, уменьшение количества выделяемой мочи, изменение цвета мочи).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- нарушения проведения электрического импульса в сердце – атриовентрикулярная блокада (головокружение, потеря сознания, слабость, одышка, появление боли в груди);
- стенокардия (внезапный приступ давящей боли в области сердца, возникающий вследствие нарушения кровоснабжения сердечной мышцы).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- аллергическая реакция – реакция повышенной чувствительности (ощущение беспокойства, покалывания, головокружение, зуд по всему телу, появление зудящих волдырей на коже и слизистых, отеки, хрипы, затрудненное дыхание, обморок).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- тяжелое поражение кожи – токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона (лихорадка, недомогание, появление болезненных пятен на коже в любых частях тела, которые сливаясь образуют большие пузыри, корки и эрозии в ротовой полости, высыпания на половых органах, отслаивание или отшелушивание больших участков кожи).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата КАРВЕДИЛОЛ.

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- головокружение;
- головная боль;
- выраженное снижение артериального давления;
- общая слабость (астения).

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- воспаление бронхов (бронхит);
- инфекции верхних дыхательных путей;
- инфекции мочевыводящих путей;
- снижение числа красных клеток крови (эритроцитов) и содержания гемоглобина в крови (анемия);
- увеличение массы тела;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- повышение уровня холестерина крови (гиперхолестеринемия);
- нарушение гликемического контроля (повышение или понижение уровня сахара в крови) у людей с уже имеющимся сахарным диабетом;
- депрессия;
- подавленное настроение;
- эпизоды кратковременной потери сознания (синкопальные состояния), состояния, предшествующие потере сознания, сопровождающиеся головокружением, потерей равновесия (пресинкопальные состояния);
- нарушение зрения;
- уменьшение слезоотделения;
- раздражение глаз;
- увеличение количества жидкости в организме (гиперволемия);
- задержка жидкости;
- снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия);
- снижение артериального давления при принятии вертикального положения (постуральная гипотензия);
- нарушение периферического кровообращения: похолодание конечностей, заболевание периферических сосудов, обострение заболевания сосудов, характеризующегося сильной болью в ногах при ходьбе (синдром «перемежающейся» хромоты) и спазм сосудов, вызывающий изменение цвета кожи, онемение и боль в пальцах рук или ног (синдром Рейно);
- повышение артериального давления;
- затруднение дыхания (одышка);
- тошнота;
- жидкий многократный стул (диарея);
- рвота;
- нарушение пищеварения (диспепсические расстройства);
- боль в животе;
- боль в конечностях;
- отеки;
- болевой синдром.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- расстройства сна;
- нарушение чувствительности, сопровождающееся ощущением покалывания, онемения (парестезия);
- запор;
- кожные реакции, в том числе: кожная сыпь, воспалительное заболевание кожи (дерматит), появление зудящей сыпи на коже (крапивница), кожный зуд, поражения кожи,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

характеризующиеся появлением зудящих воспалительных высыпаний с образованием папул или плотных бляшек с чешуйками (по типу псориаза и красного плоского лишая);

- нарушение потенции.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- снижение числа кровяных пластинок (тромбоцитов) в крови (тромбоцитопения);
- заложенность носа;
- сухость слизистой оболочки полости рта;
- нарушения мочеиспускания.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- снижение числа белых клеток (лейкоцитов) в крови (лейкопения);
- изменения в анализах крови (повышение активности ферментов печени (аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ)).

Перечисленные ниже нежелательные реакции были установлены в ходе пострегистрационного (постмаркетингового) применения карведилола:

- проявление признаков сахарного диабета, ранее протекающего без характерных симптомов (манифестация латентно протекающего сахарного диабета);
- выраженное обострение симптомов (декомпенсация) уже имеющегося сахарного диабета;
- угнетение системы организма, которая регулирует работу гормонов, повышающих уровень сахара в крови (угнетение контринсулярной системы);
- частичное или полное выпадение волос на голове, лице или на других участках тела (алопеция);
- недержание мочи у женщин, обратимое после отмены препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства-члена Евразийского экономического союза.

Российская Федерация.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, дом 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://roszdravnadzor.gov.ru/

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

5. Хранение препарата КАРВЕДИЛОЛ

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пачке картонной и контурной ячейковой упаковке после «Годен до».

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат КАРВЕДИЛОЛ содержит

Действующим веществом является карведилол.

КАРВЕДИЛОЛ, 6,25 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 6,25 мг карведилола.

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный.

КАРВЕДИЛОЛ, 12,5 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 12,5 мг карведилола.

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный.

КАРВЕДИЛОЛ, 25 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 25 мг карведилола.

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), магния стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный.

Препарат КАРВЕДИЛОЛ содержит лактозу (см. раздел 2).

Внешний вид препарата КАРВЕДИЛОЛ и содержимое упаковки

Таблетки.

КАРВЕДИЛОЛ, 6,25 мг, таблетки

Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается наличие легкой мраморности.

Круглые, двояковыпуклые, с риской.

КАРВЕДИЛОЛ, 12,5 мг, таблетки

Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается наличие легкой мраморности.

Круглые, плоскоцилиндрические, без риски, с фаской.

КАРВЕДИЛОЛ, 25 мг, таблетки

Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается наличие легкой

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7953
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

мраморности.

Круглые, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

ООО «ПРАНАФАРМ»

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 106, корпус 81

тел. (846) 334-52-32, 207-12-61

факс (846) 335-15-61, 207-41-62

e-mail: info@pranapharm.ru

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «ПРАНАФАРМ»

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 106, корпус 81

тел. (846) 334-52-32, 207-12-61

факс (846) 335-15-61, 207-41-62

e-mail: info@pranapharm.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза http://grls.rosminzdrav.ru.