ЛП-№(008578)-(РГ-RU) от 18.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.05.2026 № 8951
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

МЕТОПРОЛОЛ, 25 мг, таблетки
МЕТОПРОЛОЛ, 50 мг, таблетки
МЕТОПРОЛОЛ, 100 мг, таблетки

Действующее вещество: метопролол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат МЕТОПРОЛОЛ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата МЕТОПРОЛОЛ.
3. Прием препарата МЕТОПРОЛОЛ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата МЕТОПРОЛОЛ.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат МЕТОПРОЛОЛ, и для чего его применяют

Препарат МЕТОПРОЛОЛ содержит действующее вещество метопролол. Он относится к группе препаратов, называемых бета-адреноблокаторами; селективные бета-адреноблокаторы, и является избирательным (селективным) блокатором бета$_1$-рецепторов. Метопролол больше действует на бета$_1$-рецепторы, расположенные в сердце, чем на бета$_2$-рецепторы, расположенные в периферических сосудах и бронхах, в дозах, принимаемых большинством пациентов.

Показания к применению

Препарат МЕТОПРОЛОЛ применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения следующих заболеваний:

- артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление);
- стенокардия (определенный тип ишемической болезни сердца);
- нарушения ритма сердца (аритмии), включающие суправентрикулярную тахикардию;
- функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахикардией;
- профилактика приступов мигрени;
- гипертиреоз (состояние, при котором увеличивается образование и секреция тиреоидных гормонов щитовидной железы).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.05.2026 № 8951
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Способ действия препарата МЕТОПРОЛОЛ

Лечение препаратом МЕТОПРОЛОЛ снижает действие гормонов стресса на бета$_1$-рецепторы, расположенные в сердце, а также в других органах, таких как почки и головной мозг.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата МЕТОПРОЛОЛ

Противопоказания

Не принимайте препарат МЕТОПРОЛОЛ:

- если у Вас аллергия на метопролол, другие бета-адреноблокаторы или на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас атриовентрикулярная блокада II и III степени;
- если у Вас сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (обострение/ухудшение течения);
- если Вы постоянно или периодически применяете препараты, которые оказывают стимулирующее действие на бета-адренорецепторы и усиливают способность сердца сокращаться (инотропные средства);
- если у Вас клинически значимая синусовая брадикардия;
- если у Вас синдром слабости синусового узла (без функционирующего постоянного электрокардиостимулятора);
- если у Вас кардиогенный шок (сердечно-сосудистая патология, характеризующаяся очень низким артериальным давлением, требующая лечения в стационаре);
- если у Вас выраженные нарушения периферического кровообращения, в том числе, угроза гангрены;
- если у Вас артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление);
- если у Вас острый инфаркт миокарда при низкой частоте сердечных сокращений (менее 45 ударов в минуту), отклонении параметров ЭКГ, называемым «удлинением интервала PQ более 0,24 секунд» или систолическом артериальном давлении менее 100 мм рт. ст.;
- если Вы получаете лекарственный препарат, являющийся бета-адреноблокатором, Вам противопоказано внутривенное введение препаратов, называемых блокаторами «медленных» кальциевых каналов, таких как верапамил.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата МЕТОПРОЛОЛ проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно сообщите врачу о том, если у Вас имеются или когда-либо возникали следующие состояния:

- если у Вас отклонение параметров ЭКГ, называемое атриовентрикулярной блокадой I степени;
- если у Вас бывает боль за грудиной в состоянии покоя (стенокардия Принцметала);
- если вы страдаете бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.05.2026 № 8951
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

– если у Вас сахарный диабет;
– если у Вас тяжелое нарушение функции почек.

Дети и подростки

Не давайте препарат МЕТОПРОЛОЛ детям от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата у детей и подростков не установлены.

Другие препараты и препарат МЕТОПРОЛОЛ

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, так как препарат МЕТОПРОЛОЛ может влиять на действие других лекарственных препаратов, и другие лекарственные препараты могут влиять на действие препарата МЕТОПРОЛОЛ.

Если Вы принимаете любой из перечисленных ниже препаратов, обязательно проинформируйте об этом своего лечащего врача:

– барбитураты (препараты, применяемые для лечения эпилепсии или нарушения сна);
– верапамил, дилтиазем (блокаторы «медленных» кальциевых каналов, применяемые при артериальной гипертензии, стенокардии и нарушениях сердечного ритма);
– амиодарон, а также антиаритмические средства I класса, такие как хинидин, пропафенон, дизопирамид (препараты, применяемые при нарушениях сердечного ритма);
– нестероидные противовоспалительные препараты (например, целекоксиб, индометацин, диклофенак);
– дифенгидрамин (препарат, применяемый при аллергии);
– эпинефрин (адреналин) (препарат, применяемый для экстренного лечения аллергических реакций и в качестве сосудосуживающего средства);
– клонидин (препарат, применяемый при повышенном артериальном давлении);
– рифампицин (антибактериальный препарат);
– сердечные гликозиды (препараты, применяемые при сердечной недостаточности).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат МЕТОПРОЛОЛ не рекомендуется применять во время беременности.

Если Вы кормите грудью, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При управлении транспортными средствами или работе с механизмами следует учитывать возможность развития головокружения или усталости. При развитии указанных симптомов не рекомендуется управление транспортными средствами и механизмами.

Препарат МЕТОПРОЛОЛ содержит лактозу

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата МЕТОПРОЛОЛ

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.05.2026 № 8951
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Артериальная гипертензия

По 100–200 мг однократно утром или в два приема (утром и вечером). При необходимости Ваш врач может увеличить дозу или добавить другое антигипертензивное средство.

Стенокардия

По 100–200 мг в сутки в два приема (утром и вечером). При необходимости к терапии может быть добавлен другой антиангинальный препарат.

Нарушение ритма сердца, включая суправентрикулярную тахикардию

По 100–200 мг в сутки в два приема (утром и вечером). При необходимости к терапии может быть добавлен другой антиаритмический препарат.

Поддерживающее лечение после инфаркта миокарда

По 200 мг в сутки в два приема (утром и вечером).

При функциональных нарушениях сердечной деятельности, сопровождающихся тахикардией

По 100 мг препарата один раз в сутки, рекомендуется принимать таблетку утром. При необходимости Ваш врач может увеличить дозу до 200 мг.

Профилактика приступов мигрени

По 100–200 мг в сутки в два приема (утром и вечером).

Гипертиреоз (комплексная терапия)

По 150–200 мг в сутки в 3–4 приема.

Особые группы пациентов

Пациенты с почечной недостаточностью

Пациентам с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется.

Пациенты с печеночной недостаточностью

При тяжелом нарушении функции печени Ваш лечащий врач может снизить дозу препарата.

Пациенты пожилого возраста

Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется.

Путь и (или) способ введения

Внутрь.

Таблетки следует принимать натощак.

Линия разлома (риска) предназначена исключительно для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

Продолжительность терапии

Принимайте препарат МЕТОПРОЛОЛ столько времени, сколько рекомендует Ваш лечащий врач.

Если Вы приняли препарата МЕТОПРОЛОЛ больше, чем следовало

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.05.2026 № 8951
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Если Вы приняли больше таблеток препарата МЕТОПРОЛОЛ, чем назначил врач, немедленно обратитесь к врачу или в медицинское учреждение.

У Вас могут появиться следующие симптомы: выраженное снижение артериального давления, синусовая брадикардия, атриовентрикулярная блокада, сердечная недостаточность, кардиогенный шок, остановка сердца, бронхоспазм (спазм бронхов), нарушение сознания/кома, тошнота, рвота и цианоз (посинение отдельных участков кожи, губ или кончиков пальцев).

Если Вы прекратили прием препарата МЕТОПРОЛОЛ

Не прекращайте лечение, даже если Вы почувствовали себя лучше, пока врач не скажет Вам сделать это.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- повышенная утомляемость.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головокружение;
- головная боль;
- брадикардия (состояние, при котором частота сердечных сокращений не превышает 60 ударов в минуту);
- ощущение сердцебиения;
- ортостатическая гипотензия (резкое снижение артериального давления) (очень редко сопровождающаяся обмороком);
- похолодание конечностей;
- одышка при физической нагрузке;
- тошнота;
- боль в животе;
- диарея;
- запор.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- увеличение массы тела;
- депрессия;
- ослабление внимания;
- сонливость или бессонница;
- ночные кошмары;
- парестезия (ощущение покалывания, онемения);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.05.2026 № 8951
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- временное усиление симптомов сердечной недостаточности;
- атриовентрикулярная блокада I степени;
- кардиогенный шок у пациентов с инфарктом миокарда;
- бронхоспазм;
- рвота;
- кожная сыпь (в виде крапивницы);
- повышенная потливость;
- судороги.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- повышенная нервная возбудимость;
- тревожность;
- нарушения зрения;
- сухость и/или раздражение глаз;
- конъюнктивит;
- другие нарушения сердечной проводимости;
- аритмии;
- ринит (воспаление слизистой оболочки);
- сухость во рту;
- нарушение функции печени;
- выпадение волос;
- импотенция/сексуальная дисфункция.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- тромбоцитопения (снижение уровня тромбоцитов в крови);
- амнезия/нарушение памяти;
- подавленность;
- галлюцинации;
- нарушение вкусовых ощущений;
- звон в ушах;
- гангрена у пациентов с предшествующими тяжелыми нарушениями периферического кровообращения;
- гепатит (воспалительное заболевание печени);
- фотосенсибилизация (повышенная чувствительность кожи к солнечному свету);
- обострение псориаза;
- артралгия.

Сообщение о нежелательных реакциях

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.05.2026 № 8951
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, дом 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата МЕТОПРОЛОЛ

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пачке картонной.

Хранить при температуре не выше 25°С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат МЕТОПРОЛОЛ содержит

Действующим веществом является метопролол

МЕТОПРОЛОЛ, 25 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 25 мг метопролола (в виде тартрата).

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, повидон К-25, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.

МЕТОПРОЛОЛ, 50 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 50 мг метопролола (в виде тартрата).

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, повидон К-25, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.

МЕТОПРОЛОЛ, 100 мг, таблетки

Каждая таблетка содержит 100 мг метопролола (в виде тартрата).

Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, повидон К-25, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.

Препарат МЕТОПРОЛОЛ содержит лактозу (см. раздел 2).

Внешний вид препарата МЕТОПРОЛОЛ и содержимое упаковки

Таблетки.
МЕТОПРОЛОЛ, 25 мг, таблетки
Таблетки белого или почти белого цвета. Допускается наличие легкой мраморности.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.05.2026 № 8951
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Таблетки 25 мг – круглые, плоскоцилиндрические, без риски, с фаской.
МЕТОПРОЛОЛ, 50 мг, таблетки
Таблетки белого или почти белого цвета. Допускается наличие легкой мраморности.
Таблетки 50 мг – круглые, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.
МЕТОПРОЛОЛ, 100 мг, таблетки
Таблетки белого или почти белого цвета. Допускается наличие легкой мраморности.
Таблетки 100 мг – круглые, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.
Линия разлома (риска) предназначена исключительно для разламывания таблетки с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «ПРАНАФАРМ»

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, к. 81

тел. (846) 334-52-32, 207-12-61

факс (846) 335-15-61, 207-41-62

e-mail: info@pranapharm.ru

Производитель

Российская Федерация

ООО «ПРАНАФАРМ»

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, к. 81;

443070, г. Самара, ул. Дзержинского, зд. 46.

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «ПРАНАФАРМ»

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, к. 81

тел. (846) 334-52-32, 207-12-61

факс (846) 335-15-61, 207-41-62

e-mail: info@pranapharm.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза http://grls.rosminzdrav.ru.