ЛП-№(005518)-(РГ-RU) от 15.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Периндоприл-СЗ, 2 мг, таблетки

Периндоприл-СЗ, 4 мг, таблетки

Действующее вещество: периндоприл

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Периндоприл-СЗ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Периндоприл-СЗ.
3. Прием препарата Периндоприл-СЗ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Периндоприл-СЗ.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Периндоприл-СЗ, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Периндоприл-СЗ содержит действующее вещество периндоприл, относящееся к группе «средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему; ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)». Препараты данной группы снижают артериальное давление.

Показания к применению
Препарат Периндоприл-СЗ применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для:

- лечения артериальной гипертензии;
- лечения хронической сердечной недостаточности;
- профилактики повторного инсульта (комбинированная терапия с индапамидом) у пациентов, перенесших инсульт или транзиторное нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу;
- лечения стабильной ишемической болезни сердца (ИБС): снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов со стабильной ИБС.

Способ действия препарата Периндоприл-СЗ
Действие периндоприла приводит к расширению кровеносных сосудов, снижению сопротивления периферических артерий, улучшению работы сердечной мышцы (миокарда) и снижению нагрузки на сердце. Препарат Периндоприл-СЗ сохраняет кровеносные сосуды расширенными, благодаря чему сердце легче прокачивает кровь через них.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

2. О чем следует знать перед приемом препарата Периндоприл-СЗ

Противопоказания

Не принимайте препарат Периндоприл-СЗ:

- если у Вас аллергия на периндоприл, другие ингибиторы АПФ или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас в прошлом был отек лица, губ, языка и/или горла, который может вызывать затруднение дыхания или глотания (признаки ангионевротического отека (отека Квинке), связанный с приемом ингибитора АПФ;
- если у Вас наследственный или неизвестного происхождения ангионевротический отек;
- у женщин – если Вы беременны или кормите грудью;
- если у Вас сахарный диабет и/или умеренные или тяжелые заболевания почек, и Вы принимаете препараты для лечения при повышенном давлении, содержащие алискирен;
- если у Вас заболевание почек, связанное с сахарным диабетом (диабетическая нефропатия), и Вы принимаете препараты, известные как сартаны (валсартан, телмисартан и др.);
- если Вы принимаете комбинированные препараты, содержащие валсартан + сакубитрил (см. ниже подраздел «Другие препараты и препарат Периндоприл-СЗ»);
- если Вы проходите процедуру гемодиализа (внепочечное очищение крови) или другой тип фильтрации крови, так как в зависимости от используемого оборудования препарат Периндоприл-СЗ может не подойти для Вашего лечения в связи с высоким риском развития тяжелых аллергических реакций;
- если у Вас заболевания с ухудшением кровоснабжения в сосудах почек (выраженный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной функционирующей почки);

Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Периндоприл-СЗ проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу до начала приема или во время приема препарата Периндоприл-СЗ:

- У Вас сужение главного кровеносного сосуда, ведущего от сердца (стеноз аорты) или заболевание сердечной мышцы (гипертрофическая кардиомиопатия), или сужение артерии, снабжающей кровью почки (стеноз почечной артерии).
- У Вас другие сердечно-сосудистые заболевания.
- У Вас нарушение функции печени.
- У Вас заболевание почек, или Вы проходите диализ или другой тип фильтрации крови.
- Вы принимаете аллопуринол, цитостатики (применяют при лечении рака), иммунодепрессанты, или Вы получаете лечение прокаинамидом (применяют при нарушениях сердечного ритма).
- У Вас наблюдались серьезные аллергические реакции с отеком лица, губ, рта, языка и горла, которые могли сопровождаться затруднением глотания или дыхания (ангионевротический отек). Аллергия может возникнуть в любое время в процессе лечения. Если у Вас появились такие симптомы, **Вы должны прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу**.
- У Вас значительно повышено содержание гормона альдостерона в крови (первичный гиперальдостеронизм).
- У Вас системное заболевание соединительной ткани, такое как системная красная волчанка или склеродермия.
- У Вас сахарный диабет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- Вы придерживаетесь бессолевой диеты, принимаете пищевые добавки или препараты с содержанием калия, используете заменители соли, содержащие калий.
- Вам предстоит серьезная хирургическая операция и/или анестезия.
- Вы проходите процедуру удаления холестерина из крови (аферез липопротеинов низкой плотности);
- Вы проходите лечение от аллергии на укусы пчел, ос (десенсибилизирующая терапия).
- У Вас недавно были диарея, рвота или обезвоживание.
- Врач сказал, что у Вас имеется непереносимость некоторых видов сахаров.
- Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов для лечения высокого артериального давления:
  – лекарственные препараты, известные как сартаны (например, валсартан, телмисартан, ирбесартан), особенно если у Вас заболевание почек, связанное с сахарным диабетом.
  – лекарственные препараты, содержащие алискирен.
  Ваш лечащий врач может регулярно проверять функцию Ваших почек, артериальное давление и количество электролитов (например, калия) в крови.
  Смотрите также информацию подраздела «Противопоказания».
- Вы принадлежите к негроидной расе, так как Вы можете быть подвержены более высокому риску ангионевротического отека, а также данный препарат может быть менее эффективен у Вас при снижении артериального давления в сравнении с представителями других рас.
- Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, так как риск развития ангионевротического отека может быть повышен:
  – рацекадотрил (применяют при диарее);
  – сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты группы ингибиторов mTOR (применяют для предотвращения отторжения пересаженных органов);
  – сакубитрил в фиксированной комбинации с валсартаном (применяют при хронической сердечной недостаточности).
- У Вас состояние, при котором кровоснабжение сердца снижается или блокируется, что проявляется приступами боли за грудиной (стенокардия).
- У Вас наблюдается длительный сухой кашель, так как прием ингибиторов АПФ, включая препарат Периндоприл-СЗ, может вызывать сухой кашель.
- Если Вам была выполнена пересадка (трансплантация) почки.

Ангионевротический отек (аллергическая реакция)
При приеме ингибиторов АПФ, включая препарат Периндоприл-СЗ, может наблюдаться ангионевротический отек – тяжелая аллергическая реакция с отеком лица/губ/языка/горла, затруднением глотания/дыхания. Эта реакция может возникнуть в любой момент лечения.
Если у Вас появились данные симптомы, **немедленно прекратите прием препарата Периндоприл-СЗ и обратитесь к врачу**. Смотрите также ниже раздел 4.

Вы должны сказать Вашему врачу, если Вы думаете, что беременны (или планируете беременность). Препарат Периндоприл-СЗ не должен применяться во время беременности, так как это может причинить серьезный вред ребенку (смотрите ниже подраздел «Беременность, грудное вскармливание и фертильность»).

Дети и подростки
Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены. Препарат Периндоприл-СЗ не предназначен для приема у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Другие препараты и препарат Периндоприл-СЗ
Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

На лечение препаратом Периндоприл-СЗ может повлиять прием других препаратов. Ваш лечащий врач может принять решение об изменении дозы препарата и/или предпринять другие меры предосторожности.

Особенно важно сообщить врачу, если Вы принимаете любой из следующих препаратов:

- другие лекарственные препараты для лечения при повышенном артериальном давлении, включая ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, алискирен (см. выше подразделы «Противопоказания», «Особые указания и меры предосторожности»), диуретики (мочегонные препараты);
- калийсберегающие препараты (триамтерен, амилорид), пищевые добавки с калием или заменители солей с содержанием калия и другие лекарственные препараты, которые могут увеличить содержание калия в организме, например, гепарин и ко-тримоксазол (комбинированный препарат, содержащий сульфаметоксазол + триметоприм);
- препараты лития (применяют при мании или депрессии);
- нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты (например, ибупрофен), ингибиторы циклооксигеназы-2 (например, вальдекоксиб, эторикоксиб) для снятия боли или ацетилсалициловую кислоту в высоких дозах (3000 мг в сутки и более);
- препараты для лечения сахарного диабета, например, инсулин, метформин или глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин);
- баклофен (применяют при лечении ригидности мышц при рассеянном склерозе);
- трициклические антидепрессанты, антипсихотические средства (применяют при лечении психических расстройств – депрессии, тревоги, шизофрении и др.);
- циклоспорин, такролимус (применяют при аутоиммунных нарушениях, после пересадки органов);
- триметоприм (для лечения инфекций);
- эстрамустин (применяют при лечении рака);
- рацекадотрил (применяют при диарее), сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие так называемые ингибиторы mTOR (для предотвращения отторжения пересаженных органов);
- комбинация валсартан + сакубитрил (применяют при хронической сердечной недостаточности) (см. подразделы «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»);
- аллопуринол (применяют при подагре);
- прокаинамид (применяют при нарушении сердечного ритма);
- сосудорасширяющие препараты, включая нитраты;
- эфедрин, норадреналин или адреналин (применяют при пониженном артериальном давлении, шоке или астме);
- препараты золота для внутривенного введения (применяют при ревматоидном артрите).

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Применение ингибиторов АПФ (таких как периндоприла аргинин) во втором и третьем триместрах беременности может привести к нарушениям развития плода (снижение функции почек, маловодие, задержка окостенения черепа, артериальная гипертензия, гиперкалиемия).

Вы должны проинформировать своего лечащего врача, если думаете, что беременны (или можете забеременеть). Как правило, врач посоветует Вам прекратить прием препарата Периндоприл-СЗ до наступления беременности или сразу же, как только Вы узнаете, что беременны. Врач назначит Вам другой препарат вместо препарата Периндоприл-СЗ.

Не принимайте препарат Периндоприл-СЗ во время беременности, так как его прием может нанести серьезный вред здоровью ребенка.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Грудное вскармливание
Не принимайте препарат Периндоприл-СЗ, если кормите грудью. Немедленно сообщите своему лечащему врачу о том, что Вы кормите грудью или планируете кормить грудью.
Фертильность
Не принимайте препарат Периндоприл-СЗ, если планируете беременность. Не установлено влияние на репродуктивную функцию или фертильность.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Как правило, препарат Периндоприл-СЗ не влияет на бдительность, но у некоторых пациентов из-за пониженного артериального давления может наступить головокружение или слабость. В этом случае соблюдайте осторожность при управлении автотранспортом или работе с механизмами.

Препарат Периндоприл-СЗ содержит лактозу
Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Периндоприл-СЗ содержит натрий
Препарат Периндоприл-СЗ содержит натрий. Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 таблетку, то есть, по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Периндоприл-СЗ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза
Подходящую Вам дозу препарата Периндоприл-СЗ определит Ваш лечащий врач, исходя из Вашего заболевания, возраста и функции почек, а также Вашей реакции на препарат, которая определяется по изменению артериального давления.
В некоторых случаях, например, если у Вас снижен объем циркулирующей крови или концентрация электролитов, наблюдается декомпенсация хронической сердечной недостаточности, нарушена функция почек или если Вы пожилого возраста, начальная доза периндоприла должна составлять 2 мг 1 раз в сутки.

Артериальная гипертензия
Рекомендуемая начальная доза составляет 4 мг 1 раз в сутки.
Если необходимо, через месяц после начала лечения врач может увеличить дозу препарата до 8 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 8 мг.
Пациенты пожилого возраста
Если Вам 65 и более лет, обычно начальная доза составляет 2 мг 1 раз в сутки. После одного месяца лечения врач может увеличить дозу до 4 мг 1 раз в сутки, а затем до 8 мг 1 раз в сутки, при необходимости.

Хроническая сердечная недостаточность
Лечение хронической сердечной недостаточности препаратом Периндоприл-СЗ в комбинации с другими препаратами (мочегонными, дигоксином, бета-адреноблокаторами) начинают под тщательным медицинским наблюдением.
Рекомендуемая начальная доза составляет 2 мг 1 раз в сутки, утром. Через 2 недели лечения врач может увеличить дозу препарата до 4 мг 1 раз в сутки, при условии хорошей переносимости дозы 2 мг и положительного ответа на лечение.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Профилактика повторного инсульта (комбинированное лечение с индапамидом)
Лечение начинают с дозы 2 мг 1 раз в сутки в течение первых 2 недель. Через 2 недели лечения врач может увеличить дозу препарата до 4 мг 1 раз в сутки в течение последующих 2 недель до применения индапамида.

ИБС: снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, ранее перенесших инфаркт миокарда и/или коронарную реваскуляризацию
Если у Вас стабильное течение ИБС, лечение препаратом начинают с дозы 4 мг 1 раз в сутки. Через 2 недели, при хорошей переносимости препарата и с учетом состояния функции почек, врач может увеличить дозу до 8 мг 1 раз в сутки.
Пациенты пожилого возраста
Если Вам 65 и более лет, лечение следует начинать с дозы 2 мг 1 раз в сутки в течение одной недели, затем по 4 мг 1 раз в сутки в течение следующей недели. Затем дозу можно увеличить до 8 мг 1 раз в сутки.

Путь и способ введения
Внутрь, 1 раз в сутки, утром до еды, запивая стаканом воды. Таблетку дозировкой 4 мг можно разделить на равные дозы.

Продолжительность терапии
Лечение препаратом Периндоприл-СЗ обычно длительное, продолжительность в каждом конкретном случае определяет лечащий врач.

Если Вы приняли препарата Периндоприл-СЗ больше, чем следовало
Если Вы приняли больше назначенной дозы, немедленно обратитесь за медицинской помощью. По возможности возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.
Наиболее вероятным эффектом в случае передозировки является понижение артериального давления, из-за чего Вы можете почувствовать головокружение или потерять сознание. Если это случилось, лягте на спину и поднимите ноги, это может облегчить Ваше состояние.
Также симптомы могут включать опасное для жизни состояние нарушения кровообращения, приводящее к неспособности организма поддерживать доставку крови в ткани организма и удовлетворять потребности в кислороде (циркуляторный шок), нарушения водно-электролитного баланса (изменение содержания солей в организме), нарушение функции почек, учащенное поверхностное дыхание (гипервентиляция), учащенное сердцебиение, ощущение сердцебиения, замедленное сердцебиение, головокружение, беспокойство и кашель.

Если Вы забыли принять препарат Периндоприл-СЗ
Важно принимать препарат каждый день, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Но если Вы забыли принять дозу препарата Периндоприл-СЗ, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Периндоприл-СЗ
Ваше давление может снова повыситься. Не прекращайте прием препарата Периндоприл-СЗ, не посоветовавшись с врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Периндоприл-СЗ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Прекратите прием препарата Периндоприл-СЗ и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения любой из нижеперечисленных серьезных нежелательных реакций, которые наблюдались:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сильное головокружение или потеря сознания, вызванные низким артериальным давлением.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- отек лица, губ, языка и/или горла, который может вызывать затруднение дыхания или глотания, отек конечностей (ангионевротический отек);
- внезапное свистящее дыхание, боль в груди, одышка (бронхоспазм).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- непривычно быстрое или нерегулярное сердцебиение, боль в груди (стенокардия);
- сердечный приступ (инфаркт миокарда), возможно, вследствие избыточного снижения артериального давления у пациентов группы высокого риска;
- слабость в руках/ногах, проблемы с речью, которые могут быть симптомами инсульта;
- воспаление поджелудочной железы, которое может сопровождаться повышением температуры тела, болью в области живота, тошнота, рвота (панкреатит);
- пожелтение кожи или белков глаз (желтуха), которые могут быть симптомами гепатита;
- кожная сыпь, начинающаяся с появления красных зудящих пятен на лице, руках или ногах (многоформная эритема);
- острое нарушение функции почек (острая почечная недостаточность);
- низкий уровень лейкоцитов в крови (агранулоцитоз) или низкий уровень эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови (панцитопения).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Периндоприл-СЗ:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головокружение;
- головная боль;
- ощущение жжения, покалывания, ползания мурашек по коже (парестезия);
- головокружение с ощущением вращения (вертиго);
- нарушение зрения;
- звон в ушах;
- кашель, одышка;
- боль в животе;
- запор;
- диарея;
- расстройство вкуса (дисгевзия);
- расстройство пищеварения (диспепсия);
- тошнота, рвота;
- кожный зуд, кожная сыпь;
- мышечные спазмы;
- повышенная утомляемость и слабость (астения).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- повышение количества эозинофилов в крови (эозинофилия);
- снижение концентрации глюкозы (сахара) в крови (гипогликемия);
- повышение концентрации калия в крови (гиперкалиемия), реакция обратимая;
- снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия);
- перепады настроения (лабильность настроения);
- нарушение сна;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- сонливость;
- обморок;
- ощущение сердцебиения;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- воспаление сосудов (васкулит);
- сухость во рту;
- зудящая сыпь на коже (крапивница);
- повышенное потоотделение;
- покраснение/воспаление кожи из-за воздействия света (реакция фоточувствительности);
- воспаление кожи с образованием пузырей, заполненных жидкостью (пемфигоид);
- воспаление суставов (артралгия);
- воспаление мышц (миалгия);
- почечная недостаточность;
- импотенция (эректильная дисфункция);
- боль в грудной клетке;
- недомогание;
- отеки рук и ног (периферические отеки);
- повышение температуры тела (лихорадка);
- повышение концентрации мочевины в крови;
- повышение концентрации креатинина в крови;
- падение.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- обострение псориаза;
- повышение концентрации билирубина в крови;
- повышение активности «печеночных» ферментов.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- снижение лейкоцитов в крови (лейкопения);
- снижение количества нейтрофилов в крови, что может приводить к повышению риска инфекций (нейтропения);
- разрушение красных кровяных клеток (гемолитическая анемия), которое возникает у пациентов с врожденной недостаточностью глюкозо-5-фосфатдегидрогеназы;
- снижение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- снижение концентрации гемоглобина или гематокрита в крови;
- синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ), признаками которого могут быть потемнение мочи, тошнота или рвота, мышечные спазмы, спутанность сознания и судороги;
- спутанность сознания;
- нарушение сердечного ритма (аритмия);
- редкий тип пневмонии (эозинофильная пневмония);
- воспаление слизистой оболочки носа (ринит).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- изменение цвета кожи, онемение и боль в пальцах рук и ног (синдром Рейно).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Периндоприл-СЗ

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке и пачке картонной после «Годен до».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Храните препарат при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (блистер в пачке) для защиты от света.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Периндоприл-СЗ содержит
Действующим веществом является периндоприл.
Периндоприл-СЗ, 2 мг, таблетки
Каждая таблетка содержит 2 мг периндоприла эрбумина.
Периндоприл-СЗ, 4 мг, таблетки
Каждая таблетка содержит 4 мг периндоприла эрбумина.
Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный), целлюлоза микрокристаллическая 102, натрия гидрокарбонат, кремния диоксид коллоидный гидрофобный (аэросил), кальция стеарат.
Препарат Периндоприл-СЗ содержит лактозу, натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Периндоприл-СЗ и содержимое упаковки
Таблетки.
Периндоприл-СЗ, 2 мг, таблетки
Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской.
Периндоприл-СЗ, 4 мг, таблетки
Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Таблетку можно разделить на равные дозы.
По 10 или 30 таблеток в контурные ячейковые упаковки из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или фольги алюминиевой с термосвариваемым покрытием.
3, 6, 9 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 1, 2, 3 контурные ячейковые упаковки по 30 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную из картона для потребительской тары.
Не все размеры упаковок могут находиться в обороте.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Российская Федерация
НАО «Северная звезда»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.05.2026 № 9515
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Юридический адрес: 111524, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 47/2
Телефон: +7 (495) 137-80-22
Адрес электронной почты: electro@ns03.ru

Производитель
Российская Федерация
НАО «Северная звезда»
Ленинградская обл., муниципальный район Ломоносовский, с.п. Низинское, тер. Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарская, зд. 2, лит. Е

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:
Российская Федерация
НАО «Северная звезда»
Ленинградская обл., муниципальный район Ломоносовский, с.п. Низинское, тер. Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарская, зд. 2, лит. Е
Телефон: +7 (812) 409-11-11
Адрес электронной почты: safety@ns03.ru

Прочие источники информации
Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза: https://grls.rosminzdrav.ru/