ЛП-№(006331)-(РГ-RU) от 09.07.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.07.2026 № 12985
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Диацереин-СЗ, 50 мг, капсулы

Действующее вещество: диацереин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Диацереин-СЗ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Диацереин-СЗ.
3. Прием препарата Диацереин-СЗ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Диацереин-СЗ.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Диацереин-СЗ, и для чего его применяют

Препарат Диацереин-СЗ содержит действующее вещество диацереин, относящееся к фармакотерапевтической группе «Противовоспалительные и противоревматические препараты; нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты, другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты». Препарат Диацереин-СЗ является противовоспалительным препаратом, который применяется при болезнях суставов.
В отличие от других противовоспалительных препаратов, диацереин не вызывает язв желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению
Препарат Диацереин-СЗ применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для симптоматического лечения остеоартроза тазобедренных и коленных суставов при отсутствии необходимости достижения быстрого эффекта.

Способ действия препарата Диацереин-СЗ
Диацереин блокирует активность цитокинов (интерлейкин-1, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-α), которые провоцируют воспаление хряща при остеоартрозе. Диацереин также замедляет процесс разрушения хряща при остеоартрозе.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Диацереин-СЗ

Противопоказания
Не принимайте препарат Диацереин-СЗ:
- если у Вас аллергия на диацереин, антрахиноновые препараты (например, слабительные средства) или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.07.2026 № 12985
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- если у Вас воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);
- если у Вас непроходимость кишечника или Ваш кишечник не способен самостоятельно проталкивать пищу (псевдообструкция);
- если у Вас боли в животе неясного происхождения;
- если у Вас имеются сейчас или были в прошлом заболевания печени;
- если у Вас тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) или были в прошлом заболевания почек;
- если Вы беременны или кормите грудью.

Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности
Перед приемом препарата Диацереин-СЗ проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Обязательно предупредите лечащего врача перед приемом препарата Диацереин-СЗ, если какой-либо из нижеуказанных пунктов относится к Вам:

- У Вас имеются заболевания почек (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) и хронические заболевания почек. Ваш врач может принять решение о снижении дозы препарата. Также врач порекомендует Вам регулярно сдавать анализы, чтобы проверить работу почек.
- У Вас синдром раздраженной толстой кишки.
- Вам 65 и более лет.
- У Вас быстропрогрессирующий остеоартроз тазобедренного и коленного суставов, так как лечебный эффект препарата развивается медленно.
- У Вас частый жидкий стул (диарея). У некоторых пациентов после приема препарата Диацереин-СЗ может развиться диарея. Это может привести к обезвоживанию и снижению концентрации калия в крови (гипокалиемия). **При развитии диареи во время лечения прекратите прием препарата Диацереин-СЗ и сообщите лечащему врачу**, чтобы рассмотреть другие методы лечения.
- Вы принимаете мочегонные препараты (диуретики) или сердечные гликозиды (дигитоксин, дигоксин).
- Вы принимаете слабительные препараты.
- У Вас имеются сейчас или были в прошлом заболевания печени. У некоторых пациентов, принимавших диацереин, наблюдались проблемы с печенью, в том числе повышенный уровень печеночных ферментов (по анализам крови), а также симптомы поражения печени (например, боль в животе, пожелтение кожи и/или глаз, кожный зуд, нарушение сознания). Ваш врач порекомендует Вам регулярно сдавать анализы крови, чтобы проверить работу печени. Прекратите принимать препарат Диацереин-СЗ, если по анализам крови у Вас повысятся показатели печеночных ферментов или возникнут симптомы поражения печени, и немедленно обратитесь к врачу.

Ваш врач примет решение, следует ли Вам принимать этот препарат и требуется ли коррекция дозы и требуется ли более тщательное наблюдение.

Продолжительность лечения может быть длительной. Препарат можно принимать с анальгетиками и другими обезболивающими противовоспалительными препаратами до тех пор, пока не будет достигнут лечебный эффект препарата Диацереин-СЗ.

Дети и подростки
Не давайте препарат детям от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения диацереина не установлены.

Другие препараты и препарат Диацереин-СЗ
Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.07.2026 № 12985
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Обязательно предупредите лечащего врача перед приемом препарата Диацереин-СЗ, если Вы принимаете какой-либо из указанных ниже препаратов:

- вещества, влияющие на содержимое кишечника и скорость его опорожнения, например, большое количество клетчатки;
- антациды (для лечения изжоги);
- антибиотики или химиотерапевтические препараты (из-за их влияния на микрофлору кишечника могут участиться нежелательные реакции на кишечник);
- петлевые и тиазидные диуретики (мочегонные препараты);
- сердечные гликозиды дигоксин, дигитоксин (для лечения некоторых заболеваний сердца), так как повышается риск развития нарушений сердцебиения.

Ваш лечащий врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Диацереин-СЗ и требуется ли более тщательное наблюдение.

Препарат Диацереин-СЗ с пищей и алкоголем
Одновременный прием препарата с пищей увеличивает эффект от лечения. Принимайте препарат Диацереин-СЗ во время или сразу после приема пищи.
Употребление алкоголя может увеличить риск повреждения печени. Не принимайте алкоголь во время лечения препаратом Диацереин-СЗ.

Беременность и грудное вскармливание
Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Беременность
Данные о применении препарата Диацереин-СЗ у беременных женщин отсутствуют. Прием препарата Диацереин-СЗ в период беременности не рекомендуется.
Грудное вскармливание
Препарат Диацереин-СЗ, как и другие препараты данной группы, может быть обнаружен в материнском молоке. В связи с этим, прием препарата Диацереин-СЗ не рекомендуется в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Неизвестно, влияет ли препарат Диацереин-СЗ на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Проконсультируйтесь с лечащим врачом прежде, чем садиться за руль или работать с механизмами.

Препарат Диацереин-СЗ содержит лактозу
Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного препарата.

Препарат Диацереин-СЗ содержит натрий
Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, то есть по сути «не содержит натрия».

3. Прием препарата Диацереин-СЗ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза
Принимайте препарат Диацереин-СЗ под наблюдением врача с опытом лечения остеоартрита (остеоартроза).
Рекомендуемая доза препарата Диацереин-СЗ – по 1 капсуле (50 мг) 2 раза в день. Лечение рекомендуется начинать с 1 капсулы (50 мг) 1 раз в день с вечерним приемом пищи в первые

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.07.2026 № 12985
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

2–4 недели лечения. Затем можно принимать по 1 капсуле (50 мг) 2 раза в день с пищей: первый раз с утренним приемом пищи, второй – с вечерним приемом пищи.
Эффект от лечения препаратом Диацереин-СЗ проявляется только через несколько недель. Поэтому в период до наступления эффекта врач может порекомендовать прием анальгетиков или других обезболивающих противовоспалительных препаратов.
Лица пожилого возраста
Если Вам 65 и более лет, соблюдайте осторожность во время лечения препаратом Диацереин-СЗ. **При возникновении диареи прекратите лечение и обратитесь к Вашему врачу.**
Пациенты с почечной недостаточностью
Если у Вас имеются заболевания почек, сообщите врачу. Ваш врач может принять решение о снижении дозы в 2 раза до 1 капсулы (50 мг) в сутки.

Применение у детей и подростков
Безопасность и эффективность препарата Диацереин-СЗ у детей в возрасте от 0 до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Путь и способ введения
Внутрь, утром и вечером, после еды. Проглатывайте капсулы целиком, не открывая их, запивая стаканом воды.

Продолжительность терапии
Препарат Диацереин-СЗ принимается непрерывно длительно или курсами продолжительностью не менее 4 месяцев. Эффект от лечения следует ожидать через 2–4 недели.

Если Вы приняли препарата Диацереин-СЗ больше, чем следовало
У Вас может возникнуть диарея, слабость. Немедленно прекратите прием препарата и обратитесь к Вашему лечащему врачу или в отделение экстренной помощи ближайшей больницы. При возможности, возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

Если Вы забыли принять препарат Диацереин-СЗ
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную капсулу.

Если Вы прекратили прием препарата Диацереин-СЗ
Не прекращайте прием препарата Диацереин-СЗ, не посоветовавшись с врачом, так как Ваше состояние может ухудшиться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Диацереин-СЗ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Диацереин-СЗ **и немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций:**
Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
- аллергические реакции;
- выпуклые красные или розовые пятна на коже, сопровождающиеся зудом (крапивница);
- затруднение дыхания, свистящие хрипы, удушье (бронхоспазм);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.07.2026 № 12985
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек);
- предобморочное состояние или потеря сознания, снижение артериального давления, нарушение дыхания, бледно-синюшная, холодная, влажная кожа (анафилактический шок).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Диацереин-СЗ

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- повышение активности печеночных ферментов;
- кожный зуд;
- сыпь.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- диарея;
- тошнота;
- рвота;
- боли в животе;
- недомогание.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- интенсивное окрашивание мочи от желтого до коричневого цвета, что не требует отмены препарата или снижения его дозы.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru и npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Диацереин-СЗ

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке и пачке картонной после «Годен до».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.07.2026 № 12985
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Диацереин-СЗ содержит
Действующим веществом является диацереин.
Каждая капсула содержит 50 мг диацереина.
Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат (лактопресс) (сахар молочный), целлюлоза микрокристаллическая 102, кроскармеллоза натрия (примеллоза), повидон К-30 (поливинилпирролидон среднемолекулярный), магния стеарат.
Твердые желатиновые капсулы: титана диоксид Е 171, краситель железа оксид желтый Е 172, краситель железа оксид черный Е 172, краситель железа оксид красный Е 172, желатин.
Препарат Диацереин-СЗ содержит лактозу, натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Диацереин-СЗ и содержимое упаковки
Капсулы.
Твердые, непрозрачные желатиновые капсулы № 1: корпус желтого цвета с крышечкой коричневого цвета. Содержимое капсул – порошок желтого цвета.
По 10, 14 или 20 капсул в контурные ячейковые упаковки из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой с термолаковым покрытием.
2, 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 10 капсул, 2 контурные ячейковые упаковки по 14 капсул или 5, 6 контурных ячейковых упаковок по 20 капсул вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац.
Не все размеры упаковок могут находиться в обороте.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Российская Федерация
НАО «Северная звезда»
Юридический адрес: 111524, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 47/2
Телефон: +7 (495) 137-80-22
Адрес электронной почты: electro@ns03.ru

Производитель
Российская Федерация
НАО «Северная звезда»
Ленинградская обл., муниципальный район Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 4, к. 1

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:
Российская Федерация
НАО «Северная звезда»
Ленинградская обл., муниципальный район Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 4, к. 1
Телефон: +7 (812) 309-21-77
Адрес электронной почты: safety@ns03.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.07.2026 № 12985
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации)
https://grls.rosminzdrav.ru/
(https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).